




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2529/A/2







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2529/A/2






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2529/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2529/A/2











2529<sup>(2)</sup>  
/A/2

ZR/-.

A. XVIII. j

49 A 22

1 B 27

25018

Payne  
12/1/11







CLAVDII GALENI  
PERGAMENI INTRO-  
DUCTIO SEV MEDICVS.

DE SECTIS AD MEDICINÆ  
CANDIDATOS OPVSCVLVM.

GVINTERIO IOANNE AN-  
DERNACO INTERPRETE.



PARISIIS  
Apud Simonem Colinaum.

1 5 2 8







Μῶσαι Γουίντερίω πρὸς Ιάνου  
Ολιβέριον.

ὦ χαῖρ' ἀνὴρ φανέσασθε  
τρὶς καὶ τετάρκις καὶ πλείον,  
παρῆμην ἐνταυθοῖ πύλας  
Μῶσαι Γουίντέρω φίλαι  
Δόμεναι σοὶ ὦ ἀνδρῶν φάος  
κῦδος τ' ἀπαντᾶν λογιᾶν  
τούτως ἱατρικῆς βίβλος  
Μάγω πόκα δωσόμηναι.  
ἵκετεύομην κάλως ἔχης  
πρὸς αὐτῶς, καὶ εὖ πηθεῖς  
Παῖδες γὰρ ἐπὶ τυγχάνομην  
εἶναι, μικροῖς γυμνασμένααι.  
ἀλλ' εἰ παρέξῃ πλείονας  
χρόνους πατὴρ ἡμᾶν ζέουσ  
λεγέμεν ἄλλότ' ἄριον.



2529/A/2



REVERENDO IN CHRISTO  
Patri Ioanni Oliuerio, Abbati sancti  
Marci apud Sueffoniēses, Guinterius  
Ioannes Andernacus S. D.



Vod haectenus in vo  
tis maxime nobis fu  
it, vir amplissime, id  
nunc obtigisse feli  
citer, serio triūpha  
mus: Hoc est fauo  
rem tuum, & amicitiam: quam nuper,  
cum Galeni cōmentarium nomini tuo  
dicaſſem, obtuliſti mihi q̄ familiariter.  
Vnde quidem verū eſſe cōperio, quod  
à veteribus pulchre dictū eſt, literas ho  
mines reddere humanos. Quanta enim  
in te eſt eruditio, eſt autē ſumma, quam  
omnes admirantur & ſuſpiciunt, tanta  
quoq; animi humanitas inuenitur. Vti  
nam tales ſtudioſorum patroni plures  
a. iij.



hac tempestate extarēt, & nimirum in-  
genia non modo bona, sed etiā felicissi-  
ma prodirent. Proinde pater amplissi-  
me, denuo iam, nouas has Galeni com-  
mentationes è Græco in Latinum tra-  
latas tibi appēdere statuimus: vt eodem  
auspicio, quo superiores, in hominum  
manus perueniant: animūque tuum  
nobis deuinctiorem reddant. Porro  
quātum in versione, breui licet tempo-  
re, laborarim, non facile dixero. Primū,  
quòd alter librorum, introductionem  
intellige, omnino Galeni non sit: & sti-  
lum paulo duriorē referat. Deinde, q̃  
dictionibus Galeno inusitatis abundet.  
Hoc autem de opere pronuntio, cuius-  
cunq; sit, à Galeni scriptis nunquam fe-  
re discordare, lectuq; dignum esse. Cæ-  
terum verbum verbo reddere nō cura-  
uimus: quod interpretes indifertos fo-  
lere Cicero meminit. Lusimus arbitra-



tu nostro, sed vt omnia ex fide respon-  
derent. Ad hæc curatum est, vt Latinæ  
linguæ mundities seruaretur: quod an  
effecerimus, alij iudicent. Quāquam in  
huiusmodi argumento nullus quātum-  
libet florētis homo facundiæ, amœnita-  
tes ac gratias verborum ostentare pote-  
rit, nedum ego. Tu quādo non medio-  
crem animum ad bene sperandum fe-  
cisti vir benignissime: has quæso lucu-  
brationes læta fronte accipias, & Guin-  
terium inter cliētulos tuos annumeres.

Vale Lutetiæ. Sexto Calendas  
Octobres.

a.iiij.



INDEX PARTIVM HVMANI CORPO-  
ris, & morborum : qui in hoc libro continentur,  
eorum etiam quæ notatu digniora videbantur,  
in quo sciendum est, primo numero, folium: secun-  
do, paginam indicari.

A

Abscessus	28. 2
Æsculapius medicinam hominibus tradidit.	1. 1
Ægri in compita expositi.	1. 2
Æsculapius absolutam medicinā inuenit	1. 2
Ægyptij quomodo corpus diuidebant	11. 1
Affectus Methodicis curationē indicant	7. 2
Aliena defectu	5. 2
Aliena magnitudine	3. 2
Animi principatus in cerebro	15. 1
Animæ facultates	21. 2
Anguli oculorum	12. 1
Anatome quid	14. 2
Apoplexia	26. 1
Aqua inter cutem.	29. 1
Ardens febris	24. 1
Arquatus morbus	25. 1
Aristoteles	11. 1
Artes ex his quæ possūt, definitiōes sortiunt	6. 1
Articulorum vitia	33. 2
Ars quid	5. 1
Artium duplex differentia	5. 2
Artium diuisio	5. 2
Artes inuentæ à deorum filijs	1. 1
Aspera arteria	16. 2
Atheneus	7. 1
αιτιολογικόν.	7. 1
Auris	11. 2
Auricula & eius partes	11. 2



# INDEX.

	B	
Brachium.		12. 2
	C	
Coxarum dolores		33. 1
Caluariæ fracturæ		40. 2
Cutis affectiones		41. 2
κοῖλον.		13. 1
Chirurgica pars		42. 1
Ceruicis steatomata		43. 2
Carcinomata		44. 1
Calx		14. 1
Cruris partes		14. 1
Costæ		13. 1
Cubitus		12. 2
Clauiculæ		12. 2
Ceruix		12. 2
Concaua		12. 1
Clysteris vsus ab ibi profectus		1. 2
Casu obseruata		1. 2
Chirurgi quatuor habent communia		4. 1
Causarum diuisio		8. 1
Causarum notitia necessaria		7. 2
Cilium		11. 2
Coclea		11. 2
Capitis partes		11. 1
Confutatio Erasistrati		10. 1
Cholera.		23. 1
Coles		18. 2
Cor		18. 2
Chilus qualis		17. 2
Cæcum intestinum		17. 1
κῶλον.		17. 1
κωνοειδής.		15. 1
Cerebrum		14. 2



# INDEX

Calculorum differentia.	31. 1
Caligines.	27. 1
Capitis dolor internus	26. 2
Ceratoides, vulgo cornea.	15. 2
D	
Dux neruorum species	15. 1
Dentes	16. 2
Dexter cordis ventriculus	18. 2
Duo nostræ generationis principia	10. 1
Duplex curationis species apud methodicos	3. 2
Duplex alienum	3. 2
Discrimen inter methodicos & rationales	4. 1
Dogmatici	2. 1
Digiti	12. 2
Digiti quinque	14. 1
E	
Elephantiasis morbus	33. 2
Empiricæ hæreseos notæ	3. 1
Empirici à compertis ad incōperta transeunt	3. 1
Empirici, auxiliorū facultates negligunt	3. 1
Empirici	2. 1
Erasistrato medicina quid dicatur	5. 1
Empiricæ sectæ authores	4. 1
Elementorum qualitates	10. 2
Elementa	22. 1
Επιγλώττις asperā arteriam cooperit	17. 2
Exigua lingua επιγλώττις.	16. 1
F	
Fluxus	32. 1
Fauces	17. 1
Figura	16. 2
Fel	18. 1
Febris	22. 2
Febrium differentia	22. 2. & 23. 1



# INDEX.

Frons			11. 1
Fauces			11. 2
Fibra			11. 2
Femora.			14. 1
	G		
Genua			14. 1
Gurgulio			16. 2
	H		
Humor à capite			27. 2
Hydropis cuiusque causa			29. 2
Humores oculorum			16. 1
Hippo. duas tantum oculorum tunicas cognouit			15. 2
Humores quatuor ex prima generatione			21. 1
Hominem ex quatuor constare elementis			9. 2
Humores quatuor humanum corpus constituent			9. 2
Humanum corpus triplici constat substantia			10. 1
Hippocrates consummatam medicinam apud graecos protulit			1. 2
Herbarum & medicamentorum experimenta ante inuentam medicinam.			1. 1
Humerus			12. 2
Hypotenar			13. 1
	I		
Impetigines			33. 2
Ilia	13. 1	Index	13. 1
Interseptum.			12. 1
Iris			12. 1
In corpore aliena loco			3. 2
ὕγιανόν.			7. 1
Intestinorum morbi			25. 2
Intestinum medium			18. 1
Intestinum rectum			17. 1
Intestinum tenuius			17. 1
Ieiunum.			17. 1



# INDEX.

Intestinorum leuitas.	32. 2
Intestinorum tormina	32. 1
Inuenta ex cadauerum refectione.	1. 2
L	
Longi morbi	26. 2
Lethargus	27. 2
Lapis in vesica	30. 2
Lumborum morbi	33. 1
Leuce	34. 1
Lingua	16. 1
Lien	18. 1
Lepra	33. 2
M	
Membra fracta	45. 2
Morbus comitialis	26. 2
Melancholia	27. 1
Meatus oculorum	15. 1
Morbi præcauendi	22. 1
Morborum causæ	22. 1
Medicina trifariam diuiditur	9. 1
Meatus auditorius	11. 2
Medicinæ finē in medēdo nōdū innotescere	5. 2
Medicina quid Hippocrati dicatur	6. 1
Medicina quid recentioribus	6. 1
Medicina Herophilo quid dicatur	6. 1
Medicinæ partes primariæ	6. 2
Methodicorum affectus	3. 2
Methodicæ sectæ & mores	4. 1
Medicinæ comprehensiones ad vitæ commoditatē pertinent	5. 2
Medicina ars coniecturalis	5. 2
Medicinæ initium primum natura est	2. 1
Medicinæ principia tria	2. 1
Methodici	2. 1



# INDEX.

Medicorum sectæ tres	2. 1
Methodica quorum sit cōtemplatrix.	3. 1
Malæ seu genæ	12. 1
Maxillæ	12. 2
Mentum	12. 2
Mύσαξ.	12. 2
Medius digitus	13. 1
Medicinalis digitus.	13. 1
Minimus digitus	13. 1
Musculi.	17. 1
N	
Nares	12. 1
Nasus	12. 1
Nigrum oculi	12. 1
Notæ sectæ rationalis.	2. 2
Notæ hæresis methodicorum	4. 1
Naturæ actiones	21. 2
Nutrimenti vasa & instrumenta	16. 2
O	
Oculorum affectus	36. 2
Oculorum tunicę	15. 2
ὄσχεον.	18. 2
ὄψεσχος.	19. 1
Ossium anatome.	19. 1
Occiput	11. 2
Oculi	11. 2
Oculi candidum	12. 1
Os	12. 2
Omentum.	13. 1
Os pectorale	13. 1
P	
Podagra	33. 1
Præfagiendi pars medicinæ necessaria.	8. 2



# INDEX.

Physiologia pars quibus constat	7. 1
Pedes, & eorum partes	14. 1
Poplites	14. 1
Posteriores corporis partes	13. 2
Peritonæon	13. 1
Præcordia	13. 1
Pectus	13. 1
Pecten	13. 1
Πάγινξ.	17. 1
Pollex	13. 2
Partes manus	12. 2
Palma	12. 2
Pinnulæ seu alæ	12. 1 & 13. 2
Pupilla	12. 1
Pilorum, qui in cilijs sunt, vsus	12. 1
Palpebræ seu genæ	11. 2
Pinna	11. 2
Praxagoras & Herophilus morborum causas hu- midis attribuerunt	10. 2
Pulmonis vitium	24. 2
Pleuritis	24. 2
Plenitudinis notæ	22. 2
Πένθος.	14. 2
Planta	14. 2
Pecten pedis	14. 2
Processus narium	15. 1
Περικεράνεον.	15. 2
Palpebræ	16. 1
πυλωδός	16. 2
Παρίσθμια.	16. 1
Pulmones	16. 2
Pfora	34. 1
Quod extrinsecus incidit simplex est.	3. 2



# INDEX.

Quare à rerum natura incipiendum. 9. 1

## R

Rationalis sectæ authores 4. 1

Rerum naturæ cognitio necessaria. 7. 2

Rationalibus curationem causæ indicant 7. 2

Radius 12. 2

Recrementorū sanguineæ generationis conceptacula 18. 1

Respiratio 22. 1

Rhagoides 15. 2

Renes affecti 30. 1

## S

Scientiæ definitio 5. 1

Σημειωτικόν. 7. 2

Stomachus intestinorum principium 31. 1

Spinalis medulla 15. 2

Stomachus 16. 2

Stomachi functiones 17. 1

Σφαγίτιδες. 18. 2

Scrotum 18. 2

Sensus quinque 21. 2

Sanitas in quibus consistit 22. 1

Sanus homo quis 22. 1

Sanitas confirmanda. 22. 1

Spiritus tres 10. 1

Spiritus cuncta penetrans 10. 2

Sinciput 11. 1

Supercilia 11. 2

Scapulæ 12. 2 Sura 14. 1

Στένον. 13. 1

Stomachi affectus 25. 1

## T

θεραπευτικόν. 7. 2

Ταχὺς. 14. 1



# INDEX.

Talus	14. 1
Tibia	14. 1
Thorax	13. 1
Tempora	11. 2
Testiculi	18. 2
Triplex innatus spiritus	21. 2
Trachea arteria	17. 2
Tonsillæ	16. 1
Tribus rebus animantium vitā seruari	16. 1
Tenesmus	32. 2
Tubercula alarum	43. 2
Tetanus	26. 1
Tabes.	29. 1

## V


Vitiligo	34. 1
Vertigines.	27. 1
Vesicæ affectus	30. 2
Ventris vitia	31. 2
Visus	16. 2
Ventriculus	16. 2
Ventriculi officium	17. 2
Ventriculus alimentum ieiuno per pilorū instil-	18. 1
lat.	18. 1
Venæ sub iocinere emergentes.	18. 1
Venæ meseraicæ vim habent sanguificā.	18. 1
Vena caua	18. 2
Vreteres	18. 2
Vesica.	18. 2
Vulua	18. 2
Vertex.	11. 2
Vfus palpebrarum	11. 2
Vmbilicus	13. 1
Vola.	12. 2

## FINIS.



CLAVDII GALENI  
PERGAMENI INTRODVCTIO  
SEV MEDICVS, GVINTERIO IOANNE  
ANDERNACO INTERPRETE.

QVOMODO INVENTA SIT  
MEDICINA.



Artem inuentiones vel deorum  
filijs, vel quibusdam  
eis propinquis, quibus dij  
ipsi primum omnes illas,  
artem inquam, comunicare  
dignati sunt, Græci fecerunt  
acceptas. Hac igitur  
ratione Medicinam quoque, principem Aesculapium  
ab Apolline patre institutum hominibus  
tradidisse aiunt. Vnde eius scientiae inuen-  
tor extitisse videtur. Porro ante illum ars me-  
dica nondum hominibus fuit cognita, nisi quod  
veteres medicamentorum & herbarum, quas  
apud Græcos Chiron Centaurus, & ab eo eru-  
diti heroes nouerant: Adhæc quales Aristeo,  
Melampodi, & Polyido ascribuntur, experimen-  
ta quædam habuere. Apud Aegyptios sanè præ-  
ter herbas aliam quoque medicamentorum rationem  
in usu fuisse, Homerus hunc in modum testatur:  
Fertilis Aegyptus rerum, medicamina, partim  
Optima mixturis, partim deterrima nutrit.

b.j.



## C. GAL. PERG.

Iam vero ex cadauerum illa incisione, quam  
 in exequijs habere moris erat multa etiam  
 quæ manu administrantur apud priores me-  
 dicos inuenta esse dicuntur. Quædam ex ca-  
 su obseruata fuisse: veluti suffusis sanguinem  
 mittendum, inde quod capra quæpiam ex suf-  
 fusione male habens, stipite acutissimo in o-  
 culum impresso, visum receperit: Quin &  
 clysteris vsum ab ibi profectum esse scribunt.  
 Hæc enim collo, tanquam clysteris vtre ma- 10  
 rina Nilicq; aqua impleto, rostri aduncitate per  
 eam partem se perluit, qua recrementa red-  
 di solent. Scribit etiam Herodotus historio-  
 graphus quondam ægris in compita exposi-  
 tis, illos qui iisdem aliquando morbis labora- 15  
 rant, referre solitos quibus vnusquisq; vsum sa-  
 nitatē recuperauerit. Atq; hoc modo ex mul-  
 torum vsum ac experimētis rem medicam con-  
 flatam esse. Sed hæc quidem experiētia ratio-  
 ne vacua, nondumq; rationalis fuit. Cæterum 20  
 perfectam medicinam, & omnibus numeris  
 absolutam, verèq; diuinam Aesculapius solus  
 inuenit. Illam vero quæ inter homines versa-  
 tur, huius successores Asclepiadæ posteris ve-  
 luti hæreditario acceptam tradiderunt. Maxi- 25  
 mē Hippocrates, qui omnibus facile præcel-  
 luit, primusque consummatam apud Græcos  
 medicinam in lucem protulit.



INTROD. SEV MEDICVS. 2  
QVÆ MEDICINÆ PRINCIPIA.

**P** Rincipia medicinæ tria sunt, vnū inuentionis, Alterum cōstitutionis, Tertiū interpretationis. Inuentionis medicinæ vetustissimū planè, citràq; rationem principium experientia est: quemadmodū apud Aegyptios, reliquosque omnes barbaros. Cōstitutionis autem sicut Asclepiadum medicinæ, ratio & experientia. Interpretationis, vt scribit Athenæus, vel traditionis, quemadmodum quidam dicunt, initium, naturalis est speculatio. Hippocrates sanè breuiter, inquit, medicę rationis initium primum natura est: nam inde Dogmatici aspiciantur, quoniam ex ijs quæ secundum naturam sunt, illa quæ cōtrā habent possunt cognoscere. At sine naturalium cognitione illa, quæ à naturali habitu recedunt, nemo potest. Quinetiam in curatione naturæ rationem si-  
10 militer requirunt: quandoquidem ex naturali auxiliorū potentia, quæ cuilibet morbo idonea sint, accipiunt. Qui vero ex alijs sectis rerum naturæ rationem demoliuntur, vtriq; à quibus præsidia adferēdi modum finxere, in-  
20 cipiunt. Methodici ex communi indicatione. Empirici ex obseruatione experimentorum. Qua enim ratione Dogmaticis medicæ rationis natura, eadem Empiricis experiētia cre  
b.ij.



brò & ferè semper in ijsdem, & pari modo cō-  
tingens, principium existit. Ab hac siquidem  
historiam suam illorū quæ auditu percontan-  
do didicere, exordiuntur. Adhæc ab alio ad a-  
liud simile transeunt. Sed methodicis eviden-  
tium similitudinis inspectio, vel communita-  
tum apparentium cognitio principiū dicitur.

## QVOT SECTÆ MEDICORVM,

QVÆQVE EARVM NOTÆ.



Ectē medicorum tres sunt: Ratio-  
nalis, Empirica, & Methodica. Ra-  
tionalis naturæ rationem præbet,  
morborum causas inquit, & si-  
gnis ad illarum inuentionem utitur: curatio-  
nem capit à contrario, prout causæ exigunt.  
Nam contrariorum contraria sunt remedia.  
Quatuor ergo sunt quæ rationalē sectam in-  
dicant: naturæ, causarum morbi, & signorū ra-  
tio, postremo curationis modi indicatio. Em-  
pirica ad accidentiū concursus, quæ ægris ad-  
sunt, respicit, & cōuenientem eis curationem  
obseruat, idq; nec morbo cognito, nec causa  
comperta. Satis autem habet, si in accidenti-  
bus, quæ usu ac experimētis didicit, adhibeat:  
quæq; auditu percontando adsequuta sit: tum  
à compertis ad incomperta, similia autem, ut  
apparent specie transeat. Quæ enim ipsimet  
usu ac experiētia in multis, & sæpe in ijsdē, &



### INTROD. SEV MEDICVS. 3

pari modo obseruarūt: aut quæ casu quopiam deprehenderūt eadem semper, & similia, hæc confidenter vsurpant, non adeo curiosè, cuiusmodi sint facultatibus prædita, disquirentes.

5 Credunt vetustissimis, qui rerum per experientia sibi obseruatarum, historiam vti vocāt memoriæ prodiderūt. Vtuntur etiam à simili transgressu ad ea quæ nondum explorarūt, cum similia speciei quæ ad manum est apparent: vt malua, blitum, teutlum, & lappatum.

10 Itidem in cōtrarijs, vt cartilago & oryza. Rursus in omnibus arborum fructibus vt pirum, pomum cydonium. Notant Empiricam hæresim, cōcursus symptomatum, morbi, eiūsque

15 causæ ignorantia: dein medicaminum conuenientium per vsum cognitio: postea experitorū antea, collectio: nouissime à simili transgressus. Methodica eorum quæ in morbis similia sunt, contemplatrix est. Omnes enim

20 particulares affectus ad generales duos reducunt: adstrictum, & fluētem: quæ communia vocant. Cognoscūt ea ex obortis corpori affectionibus, in vtroque euidēter cōspicuis. Quare notas non desiderant illorū, puta compressum corpus ex densitate florisque eius retentione: tum ex cuiuslibet insignis recrementi

25 impedimento fieri. Solutum vero ex summæ cutis raritate, & sensilium cuiusque particulæ

b. iij.



excrementorum fusione. Duplicem igitur cu-  
 rationis speciem generales duo corporis mor-  
 bi ipsis indicant: nempe si corpus adstrictum  
 est, digerendum esse: si profluuium laborat, com-  
 primendum: si vitium mixtum habet, occur-  
 rendum subinde vehementiori malo. Cate-  
 rum communia omnia nominant euidentia:  
 Horum affectus, adstrictum & fluens: curatio-  
 nem, resolvere & tenere: tempora, initium, in-  
 crementum, vigorem seu statum, & inclina-  
 tionem. Porro medicinæ, quæ manu medetur,  
 communia, in eius ablatione, quod à natura  
 alienum est consistit. Duplex enim alienum,  
 est vel extrinsecus, vel in corpore. Extrinsecus  
 rursus dupliciter, illius quod in corpore est, 51  
 tres numerantur species. Atqui extrinsecus,  
 ut spina, telum, & quodcunque aliud id genus  
 existit, summam educationem ostendit. Eorum  
 quæ in corpore sunt, aliud loco alienum, ut  
 suffusio, eluxatio, & fractura: quæ transpositio- 20  
 nem vel restitutionem in proprium locum in-  
 dicant. Aliud magnitudine, ut abscessus om-  
 nes, scroti tumores, verrucarum quædam ge-  
 nera, quæ αὐτοχόρονες Græci vocant, phyma-  
 ta, & condilomata: quorum nonnulla diductio- 25  
 ne sola uti, nonnulla summa superfluum ab-  
 latione, demonstrantur. Aliud defectu alienum,  
 non ut superuacaneum, sed veluti deficientes, di-



# INTROD. SEV MEDICVS. 4

citur, cuiusmodi mutila, & curta omnia: sicut in labris oculisque cernitur. Vnde quidam λαγωφθάλμοι, & λαγώχδροι nominantur. Pari modo etiam se habent fistulae, & profunda ulcera, sinus, aliaque huiusmodi omnia quae ex defectu repletionem desiderant. Iam vero chirurgi quatuor habent communia. Adhuc speciem quam προφυλακτικὴν, id est praeservatricem appellant. Apponitur autem & ipsa communibus ad venena, & pestiferas omnes feras, quae virus iaculantur, volatiles, terrestres, & aquatiles. Nam commune omnium genus, ut sint exitialia, non tamen ad astrictum & fluens, sed aliud praeter haec genus referuntur. Proinde curandi ratio alio communi, quod prophylacticum vocant, continetur. Notae Methodicorum haeresis prima similium in evidentibus consideratio, sed non in latentibus seu abditis, quae admodum rationalis sectae. Hoc vnum intercedit discriminis, quod in illa quoque similium inspectio, sed in obscuris consistit. Secunda, quod ex similibus evidentium, affectus, auxilia, tempora, particularia omnia ad communia reducit. Attamen non evidentibus tantum Empiricorum more animadvertunt, sed particularibus, nullo generali cognito, insistent. Tertia est ex communium indicatione curatio accepta: nec causis, ut rationalibus in usu est,

b.iiij.



expositis: nec auxilijs quæ experimentis comprobata sunt, in accidētium syndrome, vt Empirici faciunt obseruatis.

## QVI TRIVM SECTARVM

PRINCIPES EXTITERINT.



Rationalis sectæ & author, & princeps Hippocrates Cous fuit. Post hūc Diocles Carystius, Praxagoras Cous, Herophilus Chalcidoni-  
 us, Erasistratus Chius, Mnesitheus Athe-  
 neus, Asclepiades Bithynus, Cienus, qui & Prusias dictus est. Empiricæ præfuit Philinus  
 Cous, qui primus eam à rationali separauit,  
 occasione ab Herophilo suo præceptore acce-  
 pta. Cum autē suam hæresim principem esse  
 vellent, Acronem Acragantinum quo ratio-  
 nali esset vetustior, ei dedisse initium dixerūt.  
 A Philino Serapion Alexandreus ea secta flo-  
 ruit. Dein Apollonij duo, pater & filius An-  
 thioceni. hos secuti Menodotus & Sextus ac-  
 curatè eam coluerūt. Methodicen Themison  
 Laudiceus Syrius incepit, quæ ab Asclepiade  
 rationali deflectēs ad methodicæ sectæ inuen-  
 tionē se contulit. Thessalus Trallianus eā ab-  
 soluit. Post hos Mnasia, Dionysius, Proclus,  
 Antipatrus. In ea autē nonnihil dissenserunt  
 Olimpiacus Milesius, Menemachus Aphro-  
 diseus, & Soranus Ephesius. Fuerūt nonnulli



# INTROD. SEV MEDICVS. 5

ἐπισυνθετικοὶ apud Græcos nominati vt Leonides Alexandreus: quidam ἐκλεκτοὶ, vt Archigenes Apameus Syrius.

## MEDICINA SCIENTIA NE

5 SIT, AN ARS.



10 **R**ationales aliqui vt Erasistratus, medicinam partim scientiam, cuiusmodi est abditarum & morbos continentium caussarum notitia, tum euidētium & naturalium actionum, partiūmq; interiorum: Partim coniecturam vt curationem & signa, habere censuerunt. Methodici in vniuersum scientiam ipsam esse asseuerant. At vtriq; à vero, maxime methodici aberrant. Sciētia enim est conueniens, firma, & nunquam à ratione declinans cognitio: eam neque apud philosophos, præsertim dum rerum naturas perscrutātur, inuenias. Multo sanè minus in re medica: imò  
20 vt verbo expediam, ne ad homines quidem venerit. Quamobrem medicina ars merito dici potest: siquidem artis nomine comprehensionum & opinionum ad finem quendam vitæ spectātium collectionē intelligimus. Comprehensiones igitur humanas, & quæ numero constitutionē quandam procreare queant, præcipue cunitas, hoc est sibi concordēs ac consonas, cohærentesq; medicina habet: quo  
25



fit, vt artis vocabulū, cuius definitio pulchrè  
 ei conuenit, optimo iure commereatur. Com-  
 prehensionēsq; in ea ad vitæ commoditatem  
 pertinent: Quippe seruare homines saluos, &  
 ægros restituere, ad vitam spectat. Sed artium **5**  
 duplex est differentia: quædam à se absolutio-  
 nem consequuntur, vt fabrilis, nauium com-  
 pactoria, ædificatoria. Quædam finem suum  
 cui scopum desiderant: cōtingunt autem non  
 semper, sed plurimum. Vnde coniecturales **10**  
 quoque dicuntur, ex quarum numero medi-  
 cina fuerit: quemadmodum rhetorica, guber-  
 natoria, & sagittandi ars. Est & alia differen-  
 tia duplex: quoniam aliquæ dum fiunt, sunt:  
 simulatque ab actione destiterint, nihil quod **15**  
 perfecerint ostenditur: cuiusmodi saltatoria,  
 cytharistica, palæstrica, & quæuis alia ars mu-  
 fica. Nonnullæ in actione euident opus pla-  
 nè nullum habent, sed tanquam futuri cuius-  
 dam præparatoriæ existunt. Vbi vero à fun- **20**  
 ctione cessauerint, tunc quid effecerint, appa-  
 ret: qualis statuaria, pictoria, & fabrilis: tum  
 aliæ quarum opera post actionem perdurāt.  
 Inter has medicinam quoque numeres licet.  
 In medendo enim nondum eius finis inno- **25**  
 tescit: quippe quæ aduersus morbos semper la-  
 boreat. At vbi curationem absoluerit, tunc ho-  
 minis sanitatem restituisse videre est.



# INTROD. SEV MEDICVS. 6

## QVID SIT MEDICINA.



5 **D**efinitionibus rationales vsi sunt, descriptionibus Empirici: de quibus quaestionem instituere philosophis solum cōuenit. Quāquam veteres etiam medici hoc ferè modo medicinam simpliciter vel definierunt, vel descripserunt. **MEDICINA** est, Hippocratis sententia, adiectio & ablatio. Adiectio quidem deficientis. Ablatio superantis in hominum corporibus. Quam enim definitionem medicinae nōnulli putauerunt, reuera non est, ægros videlicet morbis non prorsus liberare, dolores lenire, morbiq; vehementiam retundere, malo victis manum nō admoliri. Artes siquidem ex his quæ possunt, definitionē sortiuntur, non econtrario. Quoniam illa, quæ neutiquā fieri possunt, recēset, non ex ijs quæ adfunt, artes definit. Recentiores huiusmodi definitionem vsurparunt. Medicina est scientia, sanitatis conseruatric, morborum repultrix. Verum secus habet. non enim ipsa hæc efficit, sed ex illis quæ efficit hæc proueniunt, idq; non semper. Quapropter non ex his, sed 25 illis quæ ab ea semper accipiuntur, constituta est. Hæc autem sunt adiectio & ablatio. Proin id Hippocrati medicina est, cuius vsū ad præsentem hominum salutem tuēdam, amissam



recuperandam requirimus. Ex illis ergo quæ  
semper facit constituitur, non ex his quæ il-  
linc fieri solēt. Aliud nanq; ars, aliud eius finis  
est. Hunc autem non affectat illa, sed quod cir-  
ca ipsam est scilicet, neq; id perpetuo. Quò fit  
vt quousq; hoc non assequitur, non finis eius,  
sed scopus dicatur. Cum autem contigerit, fi-  
nis. Ita gubernatoria & sagittandi ars non à  
fine, quem non semper contingunt, sed qui-  
bus constitutæ sunt, & per quæ, vt finem asse- 10  
quantur, functiones obeant, definitionem for-  
tiuntur. Quæ omnibus ferè post Hippocra-  
tem proba esse videtur. Herophilo medicina  
est scientia salubrium, insalubrium, & neu-  
trorum. Trium enim horum in illa cognitio 15  
est, Salubrium quæ corporis constitutionem  
ita gubernât, vt ex eis pulchrè inuicem apta-  
tis, sanitas concilietur, Insalubrium quæ sa-  
lubrem statum dissoluunt, Neutrorum om-  
nia sunt auxilia, quæ ægris adferuntur. Hæc 20  
enim priusquam à medico excepta sint, neu-  
tra, hoc est nec salubria, nec insalubria sunt.

## QVOT PARTES MEDICINÆ.



Primariæ medicinæ partes sunt,  
rerū naturæ contemplatio: Caus- 25  
sarum morbos continentium no-  
titia: Sanitatis tuendę ratio: Signo-  
rum obseruatio, & medendi mo-



# INTROD. SEV MEDICVS. 7

dus. Græci sic vocant: φυσιολογικὸν, αἰτιολογι-  
 κὸν, ὑγιανόν, σημειωτικὸν, & θεραπευτικὸν. Athenæ⁹  
 pro signis materiam constituit, quæ in medi-  
 camētaria parte versatur. Sine illa nanq; me-  
 5 deri quis possit? Indiciōrum obseruatio curan-  
 di rationi necessaria, non tamen ipsa est cura-  
 tio. Materiæ enim beneficio curatio absolui-  
 tur: atque altera alterius poscit opem. Signa  
 vel citra curationem ad cognoscendum quæ  
 10 mederi queas, & quæ minus, necessaria sunt.  
 Adhæc faciūt ne inscius ijs qui medicinæ nul-  
 lum locum reliquerunt, manum admolitus  
 erroris notam incurras. Iam vero quinq; ha-  
 rum partium medicinæ, cuiusq; diuisio quæ-  
 15 dam angustior est. φυσιολογικὸν itaque pars di-  
 citur, in qua de hominis natura differimus.  
 Constat autem, si diuidas, elementorum no-  
 titia, quibus homo componitur: tum gene-  
 rationis foetus, & formationis: Præterea inte-  
 20 riorum & exteriorum corporis partium spe-  
 culatione, cum mortuorum cadauera incidi-  
 mus, ossiūmq; rationes perscrutamur. αἰτιολο-  
 γικὸν, in qua ea quæ præter naturam sunt in-  
 quirimus: morborū causas, accidentium con-  
 25 cursus, affectuū status diligenter indagamus.  
 His enim incognitis, nemo rectè nouerit quo  
 modo morbos curare conueniat, qui vnde hi  
 sint ignoret. ὑγιανόν sanitatē tuetur, tum præ-



cauet quò minus corpora in morbos incidāt.  
 Vbi inciderint, ad sanitatem reducat. *σημειωτικὸν* præteritorum cognitionē, præsentium in-  
 spectionem, & futurorū præfagia continet. *θεραπευτικὸν*, id est curādi facultas in tres partes  
 diducta est: vt vna esset quæ victu, altera quæ  
 medicamentis, tertia quæ manu mederetur.

AN MEDICINÆ DIVISIO IN  
 QVINQVE PARTES DIDUCTA  
 NECESSARIA SIT.



Roinde rerū naturæ cognitio ne-  
 cessaria est hoc potissimū nomi-  
 ne, q̄ nisi naturalibus antea cogni-  
 tis, ea quæ à naturali habitu rece-  
 dunt, cognoscere queas nūquam: 15  
 nam præter illorum naturam morbi cōsistūt.  
 Causarum vero morbos continentium noti-  
 tia non minus desideratur, vt affectuum origi-  
 nes, quibus resistere conuenit, intelligamus:  
 tum ipsos affectus, eorūque status à veteri- 20  
 bus appellatos cognoscamus. Vtilis fanè sym-  
 ptomatum affectibus incumbentium cogni-  
 tio est: nam ab horum concursu, quem Empi-  
 rici *ἰατρικὸν* græcè vocant, corporis vitia spe-  
 ciem nanciscuntur. Quauquam iidem Empi- 25  
 rici in syndromis quæ cuiq̄ accidenti conue-  
 niant, obseruarūt. Methodicis curationem af-  
 fectus indicant: quemadmodum rationalibus



# INTROD. SEV MEDICVS. 8

causſæ. Licet ipſi nihilo minus tum affectus,  
 tum cōcurſus inquirent. Totum autem cauſæ  
 ſis attribuunt, quarum nōnullæ προκαταρκτι-  
 καὶ, aliaὶ προγεγεννηται, quædam συνεκτικαὶ, quæ-  
 5 dam συνέργου, reliquæ συναίτιαι, Græcis nomi-  
 nantur. προκαταρκτικαὶ, igitur ſunt euidentēs  
 Latinis dictæ, quæ dum aduerſam valetudi-  
 nem crearunt, ſeparantur: vt frigus, laſſitudo,  
 calor, cruditas. προγεγεννηται, id eſt præcedētes,  
 10 ſiue internæ, quæ ab euidentibus vel præpa-  
 rantur, vel coadiuuantur: vt ſanguinis abun-  
 dantia nutrimenti copię ſoboles eſt. Præcedit  
 autem Eraſiſtrati coincidentiam, quam Græ-  
 ci πρὲς μὴ ὥσπερ nominant, quæ omnium mor-  
 15 borum cauſa eſt coniuncta. At citra præce-  
 dentem nulla eſt. συνεκτικαὶ, id eſt coniunctæ  
 ſiue continentes, quæ permanent poſtquam  
 morbum excitarunt, hoc eſt cum præſentes  
 ſunt, & affectus eorum aſſunt: cum increſcūt,  
 20 affectus augentur: cum decreſcunt, minuun-  
 tur: & cum deſinunt, finiuntur. συνέργου, id eſt  
 coadiutrices quæ ſua virtute morbum effice-  
 re non poſſunt, ſed alterius auxilio: vt libido  
 articulare morbum promouet: & remiga-  
 25 tio ſanguinis eruptionem fouet. συναίτιαι, hoc  
 eſt cohærentes, ac quaſi dicas concauſſæ, quæ  
 etſi affectum ſua vi poſſunt generare, alteri ta-  
 men cohærēt: vt lapis in veſica, & inflamma-



tio. Porro salubris illa pars non solum ut pars  
 medicinæ, sed tanquā potior ei quæ medetur,  
 præponitur. Multo enim præstat ne quidem  
 morbum prorsus admittere, quā morbo libera-  
 re: quemadmodū gubernatori longè præsta-  
 bilius est ante tempestatis exortum iter absol-  
 uere, quā fluctuatū periclitatūque euadere.  
 Atqui differunt rursus in ea parte, quā ὑγιὲς  
 Græce appellauimus, sanitatem tueri, & mor-  
 bos longius prospicere. Etenim cōsuetū victus  
 ratione primum administratur: alterū medi-  
 cinae auxilijs ad præuidendam futurā ægritudi-  
 nem, & præsentē discutiendam indiget: siqui-  
 dem quæ iam ortis affectibus medicatur, ea-  
 dem quoque prius quā oriatur, prohibet illos con-  
 sistere. Similiter artis pars, quā iuniores me-  
 dici ὁναλυστικὴν, tanquam reſectricem appel-  
 lant, differētiæ cum illis nonnihil habet. Qui  
 enim reficitur & recreatur, nondum à natura-  
 li habitu recessit, nec in eo est, sed iam priore  
 morbo defunctus, ad sequūdā valetudinem  
 reuertitur. Quamobrem aliam rationem sa-  
 lubrem desiderat, nec medicamentariam (non  
 enim ægrotat) nec eam qua sani utuntur, ut  
 qui nondum absoluta fruatur sanitate. Quò  
 fit ut nec qualitate, nec numero parī cum sa-  
 nis cibū possit assumere. **P R A E S A G I E N-**  
**D I** pars medicinæ, curationi morborum per



## INTROD. SEV. MEDICVS. 9

victum summè est necessaria: nam præterita  
 & præsentia ad morbi causam inueniendâ di-  
 ligenter inspicimus. Insuper magna eius ne-  
 cessitas est ad præfagiendum, mors, an salus  
 5 expectanda sit. Pari modo medicina quæ ma-  
 nu medetur, tum illa quæ medicamentis au-  
 xiliatur, sine indiciorum obseruatione nõ ab-  
 soluitur: quippe præfagia eodem modo desi-  
 derant, quibus scias quæ curationem non ad-  
 10 mittunt, quæcûq; eam recipiunt quidem, sed ve-  
 hementer aut offendunt ægrum si curentur,  
 aut è medio tollunt. Iam vero medicina trifa-  
 riam diuisa est: vna victu, altera medicamētis,  
 tertia manu medetur. Prima auxiliorum, quæ  
 15 digerendi, apponendi, & concoquēdi faculta-  
 tem habent est administratio. Omnibus qui-  
 dem ægrotis, sed præcipue febrientibus in vsu  
 est. Secūda incisionibus, vstionibus, & ossium  
 restauratione homines curat. Tertia tenuibus  
 20 medicamentis interiores affectus & exterior-  
 es sanat: interim eius quæ victu morbos cu-  
 rat, interim illius quæ manu medetur mutuū  
 requirit auxilium: quemadmodum hæ duæ  
 medicamentis nonnunquam vtuntur. Itaque  
 25 à rerum naturæ contemplatione, superioribus  
 paulum intermissis, auspicabimur: quoniam  
 nec in sanis sequūdam valetudinem tueri, nec  
 in ægris morbi originem siue causam cogno-

C. j.



scere, nec signis quid deprehendere, nec cūra-  
tionem admoliri rectè possis: ignorās quibus  
homo elementis constet, & quomodo his im-  
mutatis à natura quam obtinebāt prius, mor-  
bi nascantur.

## DE ELEMENTIS HVMANIS.



Constat homo ex primis mūdi qua-  
tuor elementis, igne, aere, aqua, &  
terra, naturalium cum Hippocra-  
te cōsensu. Non q̄ ex his iplis, sed  
pro portione eis respondentibus constituatur.  
Atqui Hippocratis sentētia, dum dissoluitur,  
in hæc prima reuertitur: & quodque in suam  
ipsius naturam, homine vita defuncto, redire  
necesse est: Siccum in siccum, frigidum in fri-  
gidum, calidum in calidum, humidum in hu-  
midum. Huiusmodi vniuersorū animantium  
natura est, omnia similiter oriuntur & desi-  
nunt. Conflatur enim ex his prædictis eorum  
natura, & in eadem finit. Vnde singula origi-  
nem naçta sunt, eò quoq̄ recedunt, quemad-  
modum Homerus hisce verbis innuit: Vos a-  
qua, vos tellus cunctos aliquando tenebit. Cæ-  
terū hominem ex propinquis & humanæ na-  
turæ vicinis quatuor humoribus, sanguine, pi-  
tuita, bile tum flaua, tum atra constitutum es-  
se phisici pronūciant: quoniam in prima sui  
formatione ex genitura & sanguine mēstruo



INTROD. SEV MEDICVS. 10

foetus auspiciū cæpit. In his autem quatuor  
humores erant. Qui ex tribus, ijsq; compo-  
tis hominem prodijſſe cenſent, hæc proponūt  
initia: humida, ſicca, & ſpiritus: quæ Hippocra-  
5 tes Græcè συνέχοντα, συνεχόμενα & ὀρμῶντα ap-  
pellat. Ea ferè Latinis ſonant continentia, cō-  
tenta, & quibus animi impetus debetur. Con-  
tinentia igitur ſunt ſolida omnia, vt oſſa, ner-  
ui, venæ, arteriæ: ex quibus & muſculi, & car-  
10 nes, totaq; corporis moles cōflata eſt. Adhæc  
interiorum exteriorūq; concretiones. Con-  
tenta vero humida ſunt, quæ in vasis per tota  
corpora diſperſa feruntur. Atq; hæc quatuor  
prædictos humores vocat Hippocrates. Ani-  
15 mi appetitionem ſpiritus ducunt: quos vete-  
res tres, animale, naturalem & vitalem, nu-  
merant. Stoici quartum quendam inuehunt  
ἐκτικόν, quem habitum interpretantur. Eraſi-  
ſtratus vaſa triplicia, neruos, venas, arterias,  
20 omiſſis ſpiritibus & humidis, tanquam initia  
& totius corporis elementa conſtituit. Nam  
duplici materia regi animal affirmat, ſanguis  
ne tanquam alimento, ſpiritu tanquam na-  
turæ functionibus obeundis coadiutore. Non  
25 autem ea vt principia intelligit. Multæ ſanè  
aliæ partium ſpecies non ex tribus illis com-  
poſitæ inueniūtur: vt cerebrum, medulla, atq;  
oſſa omnia. Cerebrū igitur vel medullam nu-



trimenti parenchyma, quasi adfusionem ex-  
 ponas, audet appellare: sicut adipem iocineris,  
 lienis, & pulmonis consistentiam. At ossa ne-  
 que nutrimenti parenchymata, neq; ex prædi-  
 ctis vasis triplicib<sup>9</sup> composita esse dicere pos- 5  
 sit. Asclepiadi hominis elemēta sunt corpus-  
 cula manantia, & inuisibilia foramina. Secun-  
 dum Athenæi sentētiā non quatuor illa pri-  
 ma corpora, ignis, aer, aqua, terra, sed eorum  
 qualitates calidum, frigidum, siccum, & hu- 10  
 midum. Ex quibus duo causarū efficientium  
 munere fungūtur, puta calidum & frigidum:  
 duo materialiū, siccum & humidum. Quin-  
 tum vero ex Stoicorū opinione introducitur  
 spiritus cuncta penetrans, à quo omnia conti- 15  
 nentur & gubernantur. Hippocrates cum tri-  
 fariam hominis elementa diuisisset, in conti-  
 nentia, cōtenta, & ea quæ animi impetum re-  
 gunt: quibus omnia post eum asserta elemen-  
 ta comprehendit: adhæc rerum naturæ con- 20  
 templationem, & morbos generantium noti-  
 tiā, haud scio quomodo successores ei<sup>9</sup> vnam  
 illam reuera diuinam Aesculapij medicinam  
 in tres partes diduxerunt: genuinas ab ea se-  
 parauerūt. Alij enim tum sanitatis, tum mor- 25  
 borum causam humidis attribuere, vt Praxa-  
 goras & Herophilus. Alij duris corporibus,  
 vnde initia & elementa sumpserimus: vt Era-



## INTROD. SEV MEDICVS. II

fistratus & Asclepiades. Athenæi vero & Archigenis imitatores spiritū tantum ea penetrante, tum naturalem habitum consistere ac gubernari, tum morbos vniuersos hoc prius 5 offenso creari dixerūt. Vnde & pneumatici tāquam spiritu laborantes nuncupantur.

### EXTERIORVM CORPORIS PARTIVM APPELLATIONES.

10 **H** Vmani corporis partes, earūmq; nomina primus Aristoteles docere simul & scribere instituit. Temporis autē processu medicis quoq; 15 ipsis posterioribus de ijsdem tractare operæ precium visum est: non vt dedita opera quaque particulam ostenderēt, sed ex appellatione sufficientē earū notitiam haberent. Quorum in numero maximē fuerunt Erasistrati sectatores, Apollonius Memphites, & hoc prior Xenophon. Diuidunt igitur totum corpus 20 Aegyptij quadrifariam: in caput, manus, thoracē, & crura. Alij has quatuor partes in plures diducunt, nempe in alias totius, non vt illarum particulas. **CAPITIS** igitur tota latitudo pars ipsius corporis dicetur. Huius par 25 ticulæ sunt hæ: Anterior supercilia excedens, pilis vacua, inter vtranq; aurem sita, **FRONS** nominata. Hac superior capillis intecta, **SINCIPIVT**. Partem inter vtrunlibet oculum,

c. iij.



& aurē positam TEMPORA appellamus.  
 Media iter occiput & sinciput est VERTEX.  
 Vnde velut à cētro circulus pilorum prouen-  
 tus existit. Post verticem à posteriore capitis  
 parte adusq; tendines OCCIPVT descēdit. 5  
 A priore sub tota fronte, auribus, oculis, naso,  
 & ore ad mentum vsq; circumscrip̃ta à super-  
 cilijs incipiens FACIES dicitur. Vbi enim  
 frons à superioribus descendens desinit, SV-  
 PERCILIA, ceu termini eius eminentes, & 10  
 pilis confiti eam excipiūt. In quibus autem fi-  
 nibus frons tempora contingit, ibi AVRES  
 sitæ sunt: quarū pars exterior AVRICULA  
 dicitur: parte constat superiore pinna, inferio-  
 re fibra. At interior pars forma anfractui co- 15  
 cleæ similis desinit in os, quod auriculam pla-  
 nè imitatur. In huius medio rotundum fora-  
 men, seu meatus auditori⁹ ad CEREBRVM  
 pertendit. OCVLI supercilijs subiacent, quo-  
 rum partes superius inferiūsq; interiores tu- 20  
 nicas contegentes PALPEBRAE appellan-  
 tur. Committuntur inuicem crebro & extre-  
 mo tactu ad visus recreationē: & ne quid ex-  
 trinsecus de insperato oculis incidat. Maximè  
 verò, quemadmodum in somnis, visoria vir- 25  
 tutis auertēdæ gratia, quò melius homo con-  
 quiescat. Extremum ambitum genæ superio-  
 ris antiqui CILIVM vocauere. Vtriusq; pi-

INTRO  
 los Graeci  
 minant. Faci  
 spiritum, vel  
 more parte  
 5 His itaq; ele  
 mans simili  
 re potest. In  
 rioris infer  
 li sunt: alie  
 10 ter hic par  
 medio col  
 ins rursus  
 rius occu  
 la inde ne  
 15 quo vide  
 bit NIG  
 iacere  
 tur, quib  
 pium. J  
 20 sue A  
 discrim  
 In vtra  
 propri  
 dam  
 25 attoll  
 seam  
 res M  
 quz



# INTROD. SEV MEDICVS. 12

los Græci βλεφάριδες ab origine ipsorum nominant. Facti autem in hoc sunt, vt visorium spiritum, vel, vt quidam aiunt, radios ab exterioriore parte effusos perspiciendi gratia dirigāt.

5 His itaq; elapsis, vel retortis, nequaquam animans similiter vel rectum, vel longum videre potest. Interiores oculorum termini superioris, inferiorisq; palpebræ communes anguli sunt: alter iuxta nasum, iuxta tempora alter:

10 ter: hic paruus, ille magnus. Quod in horum medio cōsistit OCULI CANDIDVM. Huius rursus medium iris circulus coloribus varius occupat. Vnde quoq; nomen à cælesti illa iride nomen accepit. Humor oculi interior

15 quo videmus PVPILLA est. Quod eā ambit NIGRVM dicitur. NASVS oculos interiacet: eius partes vtrinq; sitæ NARES vocantur, quibus aerem reddunt animantia & accipiunt. Exteriores autem partes PINVLAE

20 siue ALAE nominantur. Quod autem nares discriminat, INTERSEPTVM vocamus. In vtraque nasi parte sub oculis quædam sita, propriè CONCAVA nūcupamus: vnde quidam nomen fortiuntur. In morbis enim hæc

25 attolluntur ob hominis cruditatem vel nauseam. His autē superiores inter nasum & aures MALAE, priscis etiam GENAE dicuntur: quæ bene coloratis & ingenuis pudore suffu-

c. liij.



sis rubent. Hinc MAXILLAE ad mentum  
 usq; descendūt, & partes ipsius extremæ quasi  
 bicornes sunt. MENTVM id omne est, quod  
 labro inferiori longa orbiculatim figura sub-  
 iacet. Extrema pars malarum sub naribus  $\mu\upsilon\sigma\alpha$  5  
 Græcis, Homero  $\upsilon\pi\acute{o}\nu\eta$  appellatur. Quod  
 intra labra describitur, & ab eis constituitur &  
 continetur, OS est: Videntur enim hæc quasi  
 connata, post diducta os efficere: quare etiam  
 veluti nuper diuisa apparēt. Caput CERVIX 10  
 excipit: huius posteriores partes recti valen-  
 tesque nerui, quos Græci  $\tau\acute{\epsilon}\nu\omicron\nu\tau\alpha\varsigma$  appellant,  
 possidēt. Dein sub ceruice SCAPVLAE pro-  
 minent, quarum verticem  $\acute{\alpha}\kappa\rho\acute{\omega}\mu\iota\omicron\upsilon$  Græci no-  
 minant. At à summa costa paulo interiori q̄ 15  
 ea media est, CLAVICVLAE excrescunt.  
 Hinc HUMERVS vtrinq; incipit. Superius  
 humeri caput verticulatis scapularum ossibus  
 inseritur. Inferius brachio iunctum, CVBI-  
 TVS quoq; Latinis vocatur. Cuius exteriori 20  
 rem partem Attici  $\kappa\omicron\rho\omega\nu\acute{o}\rho$  &  $\acute{\omega}\lambda\acute{\epsilon}\kappa\rho\alpha\nu\omicron\rho$  nomi-  
 nāt. Dein BRACHIVM cōstat RADIO &  
 CVBITO, quo & homines metiūtur. Vbi hi  
 coeunt, manūiq; iunguntur, VOLA est. Op-  
 posita eius pars  $\mu\epsilon\tau\alpha\kappa\acute{\alpha}\rho\pi\omicron\mu$ , nomen latinita- 25  
 te necdum donatum. Inde recta quinq; ossa  
 ad digitos tendentia PALMAM explent, à  
 quibus ipsi DIGITIORIūtur: Græci  $\kappa\omicron\nu\sigma\acute{\iota}\lambda\alpha\varsigma$



# INTROD. SEV MEDICVS. 13

appellant. Digitorum maximus **POLLEX** est: ἀντίχειρ Græcis quasi manus altera dictus. Post hunc **INDEX**. Dein **MEDIUS**. Hunc **MEDICINALIS** sequitur, à medicis nomē sortitus. Postremus **MINIMUS** dicitur, q̃ omnib⁹ & corpore & virtute sit inferior. Itaque à vola **MANVS** incipit: mox palma asurgit, cui⁹ pars opposita ὑποτένναρ Græco nomine vocatur, Latino carens. Verum vnde digiti procedunt, **PECTEN** manus est. Quod mediū manus est, κοῖλον Græcis dicitur. **THORAX** ea pars appellatur, quæ à collo ad pendenda vsq̃ protendit. In hoc sub osse pectorali & alis vtrinq̃ costæ sunt. In harum medio **PECTVS**. Huius rursus medium vsque ad cartilaginem, sub qua ventriculi os delitescit, σέρνον Græcis dicitur. Hinc **OMENTVM** oritur. Quæ sub ventriculi ore ad partem exteriorē apparent, **PRAECORDIA** nominamus: Græci ὑποχόνδρια. Sunt autem **MVSCVLI**, qui expansi membranæ præternui veluti aranæ, quā πδελτονάειον Græci nomināt, subiacent: Extrinsecus vero cutem contegūt. Aequiuoco autem vocabulo etiam interiora viscera vocamus præcordia: sed exteriora proprio. At vniuersa hæc omētum comprehendit. **ILIA** autem inter vtrunq̃ latus consistūt. Ventrīs medium occupat **VMBILICVS**.



**LICVS.** Inde ad pubem spacium Græcis ἱερόν  
 vocatū est. Postea **PVBES** sequitur. Vbi tho=  
 rax finem, masculorū **NATVRA** **LIA** prin=  
 cipium fortiūtur: tum fœminarum ad femo=  
 ris vtriusq; processum, vt sub hoc occultētur. **S**  
**Maris COLES** postremo thorace propēdet.  
 Sūmitas eius **GLANS**: cutis quæ eam conte=  
 git **PRAEPVTIVM** dicitur. Inferior pars  
 in longitudinem vergens ἑσφὴ Græcis hæte=  
 nus vocata est. Quæ vero adusq; sedem pro=  
 ducitur, τὰ ὕπερ. Subiacēt membro genitali ge=  
 mini **TESTES**, foris & intrinsecus. Cōmu=  
 nis deinde vtrique, omnib;que interioribus  
 sinus est, qui iam conspicitur à nobis, ὀσχεόν  
 Græci, nostri scrotum vocant. Muliebris au=  
 tem pudēdi (sic enim nominaui ipsum) sinus  
 pilis decoratus, græcum nomen κτῆς obtinet.  
 At quæ sinum ambiunt, alæ vocantur. Inter  
 has autem caruncula quæ bifariam excreuit,  
 græcorum lingua ὑμφίμ, nostra colliculum ap=  
 pellare licet: quem q̄ multo promineat, Aegy=  
 ptij in virginibus excidere consuerunt. Porro  
 in ipsius naturalis collo musculus est, quo vri=  
 nam cum lubet retinemus: **ANNVLVS** à fi=  
 gura: Ab officio **FIBVLA** vocatus est. Cate=  
 rū posteriores corporis partes, quæ collo sub=  
 iacent, hunc situm & appellationem habent.  
**DORSVM** ponē pectus est, cuius vtrinque



# INTROD. SEV MEDICVS. 14

duo scapularum ossa, nostri S C O P T V L A  
 operta, Græci ὠμοπλάτας nominant. Media  
 ad amussim pars à capite ad nates vsq; S P I-  
 N A dicitur. Huius partem quæ recto tramite  
 5 lumbos diuidit, ἄκνησῆρ Homerus nominauit  
 in hoc hemistichio κατ' ἄκνησῆρ μέσσε νῶτα. Spi-  
 nam L V M B I quibus succingimur, excipiūt.  
 O S S A C R V M eius terminus est: in cuius v-  
 traque parte C O X A E sunt: in his N A T E S:  
 10 quoniam quæ his subijciuntur, maxima ossa  
 sunt. Inde carnosæ ipsis partes submittuntur.  
 Quorum G I B B A E partes, quod orbiculares  
 sunt σφαιρώματα, ceu modo circulatorum factæ,  
 Græcis nominantur. Inde corpus vnū in duos  
 15 exit processus. Nam femora à coxis statim  
 oriuntur. Vbi vero illa committuntur cruri-  
 bus, nodūmque efficiunt G E N V A nomina-  
 mus. Eorum partes ambientes quæ deorsum  
 spectāt P O P L I T E S. Ipsum autem C R V S  
 20 ab exteriori parte S V R A, priore T I B I A re-  
 cte nominatur. Postremum cruris in vtrunq;  
 latus excedens T A L V S est: ab hoc P E D E S  
 propriè appellantur: quibus etiam mēsuram  
 sibi aliam homines in altum tollentes inuene-  
 25 runt. Pars posterior C A L X: prior discreta in  
 digitos quinq; est, Græci τέρσοι vocant. In-  
 terior autem quasi pedibus inuicem se aspi-  
 ciētibus à talo versus magnum digitum pro-



cedens, nominis adhuc Latini indiga *ῥωδίου*  
 Græcis appellatur. Sub hac **P L A N T A** est,  
 qua solum cōtingimus. Cuius concavum La  
 tinum etiam nunc nomen desiderat, Græcis  
*κοῖλον* est. Quod post hoc ad digitos assurgit, **S**  
**P E C T E N** pedis nūcupatur. Plantæ palmis,  
 digiti digitis, vngues vnguibus respōdēt. Non  
 autē eadem sortiti nomina: quoniam nec eos  
 dem præstant vsus: quanquam aut numero,  
 aut situs ordine conueniunt. *sup. cōtingimus* 10.

# INTERIORVM ANATOME.

**I**Xteriorū corporis partium enar= 15  
 ratio præter vsū anatomes vo=  
 cabulum vsurpat. Est enim ratio=  
 nis singularum partium cum na=  
 turali earum situ, ordine, & vsu,  
 quem animanti exhibent, & propria appella=  
 tione, de qua verba fecimus, explicatio. Inte=  
 riorum vero propriè naturalis declaratio in=  
 cisionis nomen meretur. Siquidem oculis eas 20  
 indicatas esse, insectio non est, sed cuiusq; no=  
 titiam ratione accepisse: & naturales actiones  
 quomodo ipsas obeāt didicisse. Præterea quē  
 inuicem contextum viscera, aliæq; corporis  
 partes venarum beneficio obtineant. **C E R E** 25  
**B R V M** itaque ex nullo eorum quæ prædixi=  
 mus principe vase compositum esse videtur  
 Erasistrato: eoque nutrimenti quasi affusionem



INTROD. SEV MEDICVS. 15

ipsum vocat. Est autem corpus simplex, atq;  
ob id omniū quæ humano continentur cor=  
pore & summū, & princeps. Quapropter Pla=  
to & Hippocrates animi principatum in eo  
5 constituunt. Comprehenditur sanè membra=  
nis duabus. Vna prominenti, eiq; cōtinua χο=  
ρός Græcis appellatur. Altera hanc supe=  
rans caluariae quibusdam partibus magis ad=  
hærescit. Sed hæc nervosior, illa venosior ex=  
10 istit. Ex superiore illius parte venæ nutrimen=  
tum à corde iuxta arteriarū basim acceptum  
in id deriuant. Ex inferiore nerui principium  
capiunt, & animi functiones vniuerso corpo=  
ri communicant. Nervorum autem species  
15 duæ sunt: Vna mutuos ossium connexus tue=  
tur: Altera sentiendi mouendiq; pro arbitrio  
facultatē corpori trāsmittit. Atq; hinc etiam  
musculorum proventus est. Oculorum mea=  
tus & ipsi ab ima cerebri parte proueniunt: &  
20 per eos visorius spiritus oculis impartitur. In=  
de vero nares etiam processus habēt, per quos  
& odoramur, & cerebrum expurgatur. Ad au=  
res processus non sunt. Verū à posteriore par=  
te tenuis membrana, quam Græci μίνιγχα vo=  
25 cant, perforata est: Adhæc quæ σκωλικός Græcis di=  
citur ex eo loco processum habet: per quam  
similiter ipsæ repurgantur. In illius principio  
cerebri pars Græcis κωνός Græcis appellata sedem



habet. Iam vero illinc SPINALIS medulla incipit. Cæterum duos habet cerebrum ventriculos. Quorundam opinione vnum, vbi animi principatus desidet. At CALVARIÆ ossa superiore parte sub cute, membrana, quæ per futuras è meningibus prodijt, *περικράνεον* Græci nominant, conteguntur. Atq; hæc origo membranæ costas succingentis, *ὑπεζωκότα* nominant, & septi transuersi, & peritonæi, & deniq; illius ex toto quæ nervis cõstat. OCULVS ex Hippocratis sententia habet duas tunicas, quas Græci *μηνιγγὰς*, quòd ex illis pro- uenerint, appellat. Recentiores tres ponunt: nonnulli quatuor. Ex quibus superior à Græcis *κερατοειδὴς* vocatur. Ea qua parte alba est, satis crassa, pupillæ loco extenuatur. Perspicit vbi nigra, vel cæsia, vel flaua apparet. Huic inferior adiūcta est media parte, qua pupilla est: modico foramine, concaua, circà tenuis, acino vuæ similis, quæ *χαραδοειδὴς* à Græcis nominatur. Tertia retis modo, sinum habens *ἀμφιβληστροειδὴς* nuncupatur: nōnulli eam in summo quartam tunicam excipere tradūt, quam *ἀσκληρον* ceu minus apparentem vocare consue- runt. Est etenim membrana minima simul & tenuissima: sed prior & secunda firmę crassæq; tunicæ sunt: tertia vero & quarta tenuissi- me. Quare Hippocrates priores solas cogno-



# INTROD. SEV MEDICVS. 16

uit: oculus inquiring membranas duas habet.  
 Porrò triplices hæ tunicae humores continēt.  
 Hunc ab aquae similitudine ὕδατος εἶς Græci  
 vocant. Illum ὕαλοειδής, quòd vitro quiddam  
 5 simile referat. Tertium χρυσάλλοειδής, à quo vi  
 dendi facultas proficiscitur. Palpebrarum in  
 teriores partes carnosæ: mediæ cartilaginosa:  
 Exteriores cute teguntur. At quoniam carti  
 lago media dura est, adeps mollissima tactu  
 10 subiecta est: quæ frequenter exuperans, gut  
 tas parit. LINGVA maximè carnosæ est, in  
 quam duplex neruorum genus ab ima parte  
 cerebri prodiens inseritur. Alij molles appel  
 lati, gustandi sensum, Alij duri motum arbi  
 15 trarium à principio suo deducunt. Ad huius  
 radicem exigua in arteria sub faucib⁹ ipsis est  
 lingua, quæ cum spiramus attollitur: cum ci  
 bum potionemq; assumimus, arteriam clau  
 dit, ne quid in eam delabatur. Cuius rei quoq;  
 20 causâ tonsillæ numero quatuor creatæ sunt:  
 duæ ad linguæ radicem, vtrunque conspicuæ:  
 duæ penitus his minus prominēt. Nominan  
 tur eedem etiam Græcis παρίσθμια, quoniam  
 locus in quo sitæ sunt, maximè isthmo, cum  
 25 per inflammationem intumuerūt, figura re  
 spondent. Nam quum tribus rebus animan  
 tium vita teneatur, cibo, potione, spiritu: ad  
 hunc quidem percipiendum, nares, os, fauces,



aspera arteria, & pulmo partes sunt aptissime.  
 Nares sanè & os respirationi seruiunt. Gurgi-  
 lio ne frigidus in fauces aer cumulatim irrum-  
 pat: Aspera arteria, vt eundem in pulmones  
 deducat, quorum in pectore sedes est: per hos §  
 omnis fit respiratio: submittentes quidem se,  
 vt spiritus emittatur: attollentes vero, vt ani-  
 mam recipiāt. Quare vsu similitudinē quan-  
 dam cum fabrorum officinis habere videtur.  
 Figurā vero vngulæ bubulæ seruāt. Porro ex 10  
 spiritu quicquid vtile, ac vitæ necessarium in  
 pulmonibus elaboratū est, ad sinistrum cordis  
 ventriculum defertur. Quicquid inutile est, il-  
 lac qua inspirauimus efflatur. Nutrimenti va-  
 sa ad excipiendum, & instrumenta ad elabo- 15  
 rationem instituta hæc sunt: os, dētes, stoma-  
 chus, vētricus, ieiunum, & tenuia intestina.  
 Os quidem & dentes cibum extenuant mol-  
 liuntq̃. Stomachus appetit & diglutit: appen-  
 sus asperæ arteriæ ad septum vsq̃ trāsuersum 20  
 porrigitur. Ventriculus cibi receptaculum pri-  
 mam molitur cōcoctionem: incipit à media  
 cartilagine, vbi ventris os situm dicitur. Sub-  
 fidet leuiter iocineri, latitudine Græcorum li-  
 teram σ referens: & paulum in dexterio- 25  
 rem partem cōuersus, in summum intestinum co-  
 artatur. Hanc iuncturam πυλωρον Græci vo-  
 cant: quoniam portæ modo, ne nutrimentum



# INTROD. SEV MEDICVS. 17

ex eo delabatur, prohibet. Ab eo ieiunum in-  
 testinum incipit, in sinus vehementer impli-  
 citum: cui tale est vocabulum, quia nunquam  
 quod accipit continet. Cōmittitur autem me-  
 5 dio intestino, quod venæ in id ascendentes in-  
 tertexunt. Inde tenuius intestinum est supe-  
 riori ita cōnexum, vt pars eius esse videatur:  
 quippe quod haud adeo substantia dissimile  
 sit. Differt tamen q̃ nec vacuum sit, nec vaso  
 10 rum copiam habeat: per quæ ad iocineris por-  
 tas alimentum permanet. Deinde crassius al-  
 terū transuersum est, alimento recipiendo ac-  
 commodatum, cui cæco nomen dederunt ve-  
 teres. Huic adhærescit aliud maius. Græci κώ-  
 15 λον nominant: quod excremēta per digestio-  
 nem segregata suscipit: Quibusdā eius mem-  
 branis à iocinore & liene super vmbilicum ve-  
 niētibus: atq; hinc dextrā recurvatum in imo  
 20 dirigitur, qua excernit, totum amplectens ab-  
 domen. Ideoque rectum intestinum in quod  
 definit, ibi nominatur. Cum igitur duo mea-  
 tus, siue itinera à lato oris spacio incipiant, al-  
 terū iuxta priorem colli partem, asperam ar-  
 teriam nominamus: alterū stomachum. Vn-  
 25 de vero initium capit arteria, & vbi cooperi-  
 tur, Latini fauces, φάρυγγα Græci vocant. Cæ-  
 terum omnis meatus ex cartilaginibus annu-  
 li modo vel circuli cōpositis constat, quò fir-

d.j.



C. GAL. PERG.

mus cōtinuæ animantis respirationi maneat,  
nec comprimatur: Quare etiam ostium eius  
patescit. Nam si in cibo assumēdo error com-  
mittatur, ne vel paululū respirare queas. Hu-  
ius rei gratia purum hunc spiritui transitum **5**  
natura dedit, ne impedimēti quid sentiat. Ver-  
bi gratia si quid vel cibi, vel potus in arteriam  
delabatur, strangulationes, tormina, & tusses  
grauissimæ excitantur: donec à spiritus impe-  
tu efferatur. Iam vero aspera arteria spiritum **10**  
pulmoni transmittit: desinitq; in eiusdem ar-  
terias, quas asperas quoq; nominant. Stoma-  
chus interior ceruicis vertebris annexus, ad  
ventriculum fertur. Rursus quoniam arteria  
exterior à cibo infestatur, natura ad hoc mo- **15**  
lita est minorem linguam quæ eam operit: at  
que alimentum à lingua velut ventilabro pur-  
gatum, & gulæ initio superimpositum ad sto-  
machū pontis modo deiicit. Stomachus pro  
naturali functione appetendi facultatem ha- **20**  
bet: dum appetit quidē, se attollit: & quæ offe-  
runtur, deglutit: dum accepta superioris ven-  
triculi orificio contiguo per transuersum se-  
ptum tradit, submittitur. Per quē angustum  
etsi meatum in imam alimenta descendunt. **25**  
Ventriculi naturæ officium est, vt alimentum  
sibi cōmissum concoquat, quod à concoctio-  
ne primū ptissanæ cremori persimile est. Ve-



# INTROD. SEV MEDICVS. 18

rum per arctiorē adhuc iuncturam imæ venæ  
 triculi partis cū summo intestino, quam πύ-  
 λωρον à Græcis appellari diximus, alimētum  
 ieiuno instillat: quod cū tenue sit intestinum,  
 5 in flexuosissimos orbes natura implicauit, ne  
 ex facili videlicet diffecaretur, cōuellereturq̃.  
 Medium intestinū anfractus & orbes eius am-  
 plectitur, atq̃ ipsis insidet: quanquam id non  
 solū hunc præstat vsum, sed etiam venæ duæ  
 10 sub iocinere emergentes: quæ post in diuersas  
 partes diducuntur, & meseræo adiunguntur:  
 quò & ipsæ (sunt enim tenues) ruptionis peri-  
 culum effugiant. Adsurgunt autem sic inter-  
 textæ eidē simul basi huic innitentes, & sca-  
 15 læ nauticæ instar alleuatae finiunt. Atque hoc  
 pacto in singulis anfractib⁹ ad hirudinum si-  
 militudinem cōpositis, aperto ore ieiuno in-  
 hiantes, omnem in eo alimoniam in succum  
 conuersam exugunt. Simul autem inter ex-  
 20 ugēdum, protinus in sanguinē mutant. Non  
 enim alibi vel pituitæ, vel sanguinis, vel alte-  
 rius cuiusdam vas esse, natura indicat. Rursus  
 igitur duæ ex multis venæ à medio intestino  
 acceptum ad iocinoris portas digerunt. In io-  
 25 cinere quum sanguinis naturam nutrimentū  
 induit, recrementa singula pariter secernun-  
 tur. Flaua bilis ad tunicam inferiori eius parti  
 inhærētem defertur. Atra ad lienem. Iam ve-

d.ij.



ro ab hepate verſum in ſanguinē alimentum  
 in dextrum cordis ventriculum diſtribuitur.  
 A corde per grādes venas in dextra ſiniſtrāq;  
 circa guttur apparentes (σφαγιτιδες à Græcis  
 nominātur) ad ſuperiores corporis partes de- 5  
 riuat. Per cauam autem venam in vniuerſum  
 corpus diffunditur. Ab hac rami duo ſanguine  
 iam à ſero diſcreto ad renes perreptāt, qui  
 lumbis ſub imis coxis inhærent. Inde ſingu-  
 læ venæ colore albæ ad veſicam feruntur, ουρη- 10  
 τήρας Græci vocant, quòd per eas inde deſcen-  
 dentē vrinam in veſicam deſtillare concipiūt.  
 Veſica autem vrinam per colem foras excernit.  
 Teſticuli vero fibrarum ſubſtantia prædi-  
 ti, conceptacula & officinæ ſeminis ſunt: q̃ per 15  
 ſingulos neruos ab inguibus depēdentes, Græ-  
 ci κερμασθήρας nomināt, ad eos deſtillat. Qui-  
 bus cum alia vaſa quoq; deſcendunt puta binę  
 & venæ, & arteriæ nutrimētum conferentes.  
 Hæ autem duabus tunicis conteguntur: qua- 20  
 rum tenuiorem Græci ἐρυζοειδῆ: valentio-  
 ρέστερον appellant. Communis deinde vtri-  
 que teſticulo ſinus eſt, ὄσχεον à Græcis, ſcrotum no-  
 ſtris dicitur. Fœminis autem vulua ſcroti con-  
 uerſi ſimilitudinē refert. Venæ in partem eius 25  
 interiorem plurimū aperiuntur, per quas ſan-  
 guis excernitur, qui grauidis retinetur: ceditq;  
 in alimentum fœtui, & formationem. Nam



# INTROD. SEV MEDICVS. 19

à venis quæ locum infanti datum implicant,  
binæ aliæ prodeunt venæ: ab arterijs binæ ar-  
teriæ: & à nervis vnus nervus mutuo in vnū  
congressu meatum quendam ab anatomicis  
5 Græcis *ὀυραχορ* appellatum absoluunt: qui in-  
fantis vmbilico inseritur: ex quocq; suspensus  
infans fouetur. Ab vmbilico autem venæ ad  
iocineris portas sanguinem in foetibus trans-  
mittunt. Arteriæ iuxta vesicam sitæ, crassiori  
10 arteriæ: nervus hic spinæ insertatur.

## DE EA ANATOMES PARTE

QVAE AD OSSA PERTINET.



15 **S**isium duplex cōpositio: vna ad  
motum & ad omnē corporis a-  
ctionem accōmodata, nomen ar-  
ticuli habet: altera ad stabilitatē,  
*συνάρθρωσις* à Græcis dicitur. Hu-  
ius autem tres sunt species: Sutura, commissu-  
ra seu iunctura, & conglutinatio. Sutura igitur  
20 tur capitis ossa constant quinq; potissimum.  
Prima per sinciput *σεφανιαία* Græcis dicitur.  
Altera à vertice per medium caput ad frōtem  
procedit, *ὀβολαία* vocatur. Tertia occipitium  
à summo capite deducit, ad aures per verticē  
25 tendens *λαβροειδής* ei nomen est. Duæ super  
aures tempora à superiore capitis parte discer-  
nunt, quas *κροταφίαι* nomināt. OSSA CAL-  
VARIÆ septē numerantur. Sincipitis vnū.  
d. iij.



C. GAL. PERG.

Verticis duo. Temporum item duo. Occipitiū  
vnum. Septimū palato iūgitur. Cerebrū duos  
à posteriore parte processus vtrique obtinet,  
κορῶνας Græci appellant: qui primæ vertebræ  
insinuantur: in qua velut axe sequentis caput  
in latera mouetur, annuit, renuitq̃. Deinde of  
fei quidam processus paululum inuicem dissi  
dentes, per quos vtrinque recti, valentesq̃ ner  
ui, deorsum feruntur. Pōst alia duo ossa super  
foramina, per quæ facultas audiendi est, emer  
gunt, iugalia nominari possunt ab eadem si  
militudine, à qua id Græci ζυγωδῆ appellat.  
Sub his rursus alia duo petrae modo & crassa,  
& inæqualia prominēt, λιθοδῆ vocant. Priore  
capitis parte processus sunt telo similes: hinc  
quoq̃ βελανοειδῆς à Græcis dicuntur. Facti au  
tem sunt ad faucium diuisionem. Vbi sum  
mæ eorum partes cartilagine committuntur,  
os ὕοειδῆς appellatur. Quæ vero has adhuc ex  
cedunt, nomen tum apud Græcos, tum Latī  
nos desiderāt. In priore parte à superiorū den  
tium gingiuis per mediū palatum vnā proce  
dens os, πολυμόρφον nominant. Porrò mala  
rum ossa cōnexu mutuo cōstant. Facies item  
eiusmodi cohærentias nouem habet. Prima  
sub interioribus oculi vtriusq̃ angulis deor  
sum spectat. Duæ à latere narium vtroq̃. Alia  
medias nares recta interfecat. Malæ quoque



singulas transfuersas habēt. Duæ rursus transfuersæ palatum secant: vnâq; per mediũ idem palatum procedit. Communes autem faciei & capiti connexus, qui à tempore incipiens, 5 per medios oculos, narésque transfuersus peruenit ad alterum tempus. Iam quidem faciei duodecim ossa sunt: Narium duo. Oculorum quoq; totidem. Palati quatuor. Malarum singula, ad alarum similitudinem structa. Maxilla quibusdam duo in mento connata, nonnullis vnum habet. Cæterũ dentes conglutinantur, nempè maxillæ, & superiori ossi malarũ. Sunt autẽ numero triginta duo. Ex his quaterni primi (quia secant) τομεις à Græcis nominantur: Hi deinde quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. Vltra quos maxillares seu molares viginti sunt. Reliquorum ossium claues in altiore scapularum parte coeunt deligantur. In pectore articulus & commissura simul mixtæ videntur. Et Romanæ literæ S, eiũsque simplicis figuram ostendunt. 20 Dein costæ duodecim vtroq; latere ad imum pectus perueniunt. Septem ex eis spinæ vertebris, cumq; osse pectorali coeunt. Reliquæ quinque à posteriore parte spinæ inseruntur. 25 Inde patefcunt, & in exteriorẽ partem recuruatæ paulatim in cartilaginẽ degenerant. Vertebrae vero quatuor & viginti sunt. Septem in d. iij.



C. GAL. PERG.

ceruice. Duodecim ad costas. Reliquæ proxima costis ad lumbos. Quamquam os sacrum ex vertebra inuicem coeuntibus constare videatur. Quin & pectus similiter ex septē ossibus vnā commissis ensis figura structum esse s apparet. At humerus vterq; verticulatis scapularum ossibus inseritur. Scapulæ vero musculis posteriore parte costas subeuntibus incumbunt. Cubitus & radius, quem Græci κερκιδρα appellat, commissuræ quidem modo se se contingunt: Articuli vero, brachij tuberculum excipiunt. Tribus enim vertebra humerus in cubitum structura literę σ simili inseritur. Quarta iam vertebra radius veluti circa axem voluitur. Primæ palmę partis, quam volam nominant, tria ossa mutuo connexu deligata sunt: ad cubitum tamen & radium articulū aptè faciunt. Ex altera parte recta quinque ossa videre licet: articulum cum volæ ossibus, quibus connata sunt, explent. Inde digiti 20 orti ex ternis ossium nodis constant, & in singulis articulum expediunt. Femoris os vnum est: cuius caput leniter reflexum in coxæ sinus cōijcitur. Quam commissuram nervus, qui è medio sinu prodit, & in femoris caput 25 inseritur, cōtinet. Coxarum ossa singula à posteriore parte cū osse sacro, priore inter se connexum habēt. Vbi pubis ossa vel pectinis no-



# INTROD. SEV MEDICVS. 21

minatur. Ipsum autē crus est ex ossibus duobus: alterū ab exteriorē parte positum, Suram nostri,  $\omega\epsilon\rho\acute{o}\nu\kappa\mu$  Græci appellant. Alterū à priorē, cui tibia nomē est, solum cum femoris inferiorē capite committitur. Quatuor autem in superficie figuras repræsentat, in quas femoris duas vertebrae excipit. Quib⁹ à priorē parte paruum os, obliquum, sublatum, scuti brevis instar, cōmissuram earum in summo continens incumbit, patellam Latini vocant. Suræ autem superior extremitas interiori tibiæ parti connectitur. Inferior ad talos cum tibia ligamento nerueo, cartilaginosoq; deligatur. Intus autem in se ossa conuinciēs, calcaneum ostendit: quod in pedis longitudinem situm, ad suram assurgit, fixūq; ibi firmiter est. Cæterum tibiæ ossibus, tum ei quod  $\sigma\kappa\alpha\phi\omicron\delta\delta\eta$  vocant, talus in articulo cōmittitur. Rursus scaphoides, vbi cum talo coit vasculorum modo sinuatū est. E regione gibbū, calles trās habet, quib⁹ singula ossa  $\chi\alpha\lambda\kappa\omicron\delta\delta\eta$  inserūtur. Porro, quod cubi figurā repræsentat, extrinsecus situm est. Coniungitur autem carnosæ parti & calci. Processum ex inferiori ad priorem partem occupat, quem primæ pedum regionis os retinendi ipsius gratia subiit. Cætera ossa pedis, ad eorū quæ in manu sunt, similitudinem instructa sunt. Cōtrahunt autem horum iun-



C. GAL. PERG.

Eturas membranosa quædam ligamēta. Talos  
& calcem valida admodū: Et quædam ex ijs  
rotunda simul & neruea, cartilaginosaq̃.

DE HVMORIBVS.

**H**vmores corporis ex prima gene- 5  
ratione quatuor, commixti inui-  
cem & contemperati sunt. Exupe-  
rat autem alius in alio magis lo-  
cos: sanguis in corde, pituita in capite: Flaua bi-  
lis in iocinere, atra in liene. Cæterum triplex 10  
spiritus innati species: alius naturalis: alius a-  
nimalis: tertius vitalis. Non desunt tamē qui  
quartum quoq̃ asseuerāt hec̃ticon, solida con-  
tinentem. Naturalis animantia & stirpes nu-  
trit. Animalis sentiendi, mouendiq̃ facultatē 15  
animatis exhibet. Nam his trib⁹ animalium  
natura constat. Quare animalis in cerebro se-  
dē habet. Naturalis in iocinore, vitalis in cor-  
de. Hec̃ticus in toto corpore versatur. Natu-  
ræ actiones sunt, ab origine imprægnatio, con- 20  
formatiōq̃: in editis appetitus: cibi confectio,  
concoctio, digestio, in sanguinem alteratio,  
excretio, nutritio, & auctio. Excernuntur au-  
tem in corpore stercus, pituita, vtraque bilis,  
vrina, sudores, mucci, salua, & lac. Animæ ve 25  
ro facultates, sensus & voluntas. Sensus quidē  
sunt quinque, quibus animantia per corporis  
instrumenta funguntur: visus, auditus, gusta-



## INTROD. SEV MEDICVS. 22

tus, odoratus, & tactus. Instituit autem anima quædam sine corpore, vt cū ratiocinatur, vel irascitur. Cum corpore, vbi id ad quorundam receptionem, vel excretionem, vel ad loca mouet. Respiratio cōposita quædam actio esse videtur: partim ex arbitrio, partim spontè & naturaliter, vt in somnis, contingens. Sanus igitur homo est, primis, vnde constat, elementis: & secundis, vnde formam acceperit, 10 quatuor humoribus, mediocriter inuicē con-  
temperatis: Solidis autem partib<sup>9</sup> nec diuisis, nec conglutinis, nec è loco suo motis: Spiritibus nec intensis nimium, vt in phreniticis: nec dissolutis, vt in lethargicis: vel in ijs, qui 15 stomacho laborant. His enim hecticus spiritus resolutus esse videtur. Sanus autem homo conseruandus est consuetis exercitijs, & cibis domi natis: copia eorū obseruanda est, ex qua cruditates oriūtur: quæ morbos pariunt. Præ-  
20 cauendi morbi sunt, vel qui iam imminet, vel futuri sunt. Si ex plenitudine proueniant, inedia, vel purgatione, vel venæ incisione curandi sunt. Si ex labore & indigentia, recreare corpus & nutrire cōuenit. Verū vniuersi mor-  
25 bi, ex Hippocratis sententia, partim extrinsecus ex aere nos ambiente: partim intrinsecus ex esu, potionēq; proficiscuntur: à quibus humorum aliquis vel increfcit, vel imminuitur,



vel qualitatem commutat. Ab his etiam spi-  
 ritus insiti nunc intenduntur nimis: nūc plus  
 æquo relaxantur. Solida vero corpora foris &  
 intrinsecus pluribus morborum periculis op-  
 portuna sunt. Erasistratus quidem & Asclepia  
 des in vniuersum vnam cuiq; morbo causam  
 tribuunt. Hic sanguinis in arterias coinciden-  
 tiam: ille corporeæ molis extensionem, rari-  
 tatēq;. **P L E N I T V D I N I S** notæ sunt va-  
 sorū intensio, faciei rubor, totius corporis tu-  
 mor, & pulsuum magnitudo cum robore. In-  
 digētiae signa: collapsus corporis, gracilitas in  
 facie, & exiguus pulsus cū imbecillitate. Itaq;  
 febrem veteres per se affectū arbitrantur. Era-  
 sistratus, & recentiorum nonnulli accessoriū.  
**F E B R I S** igitur est natiui caloris in vehemē-  
 tiorem conuersio. Nam intrò reclusus perspi-  
 ratum non habet. Indicia febricitantium col-  
 ligimus ex calore intenso & intolerabili, tum  
 in accessione statim ex obscuro, inæquali, &  
 crebro pulsuum motu: In statu, ex vehemen-  
 tissimo motu, & veloci admodum. Iuniores  
 calorem naturali magis ardentē, mordacem,  
 acrem, & constantem, cum pulsuum frequen-  
 tia, & duritie, ex alto venientem, febrem esse  
 definiunt. Sunt autem duæ eius species om-  
 nium sententia: continua, & deficiens. Conti-  
 nua est, quæ non in decessionem prius, quàm



# INTROD. SEV MEDICVS. 23

morbis ex toto solutus sit, venit. Deficientis  
rursum sex species inuenimus apud veteres:  
quotidianā, tertianā, quartanā, quintanā, se-  
ptimanā, & eam quæ à nono die nomē habet.

- 5 Quotidiana est quæ die noctēq; accessionē &  
decessionē implet. Tertianā vnum diem præ-  
stat integrū, tertio redit. Quartana duos dies  
intermittit: deinde reuertitur. Quintana tres.  
Septimana quinque. Quæ à nono die vocata  
10 est Græcis ἐννατηρία, septem. Nam quæ ἐμμε-  
τηρία nominatur, modo inter continuas, mo-  
do inter deficientes ponitur. Iam vero reliquo-  
rum morborum duo genera sunt: vel cum fe-  
bribus, vel sine febribus. Quidam enim acu-  
15 ti: quidam longi sunt. Acuti quidem hi: Phre-  
nitis, ardor vehemens, Synanche, Lateris do-  
lor, Pulmonis vitium, Stomachi affectus, Re-  
gius morbus, Cholera, Voluulus, Coli dolor,  
Apoplexia, Tetanus, Opisthotonus, Empro-  
20 sthotonus. Acuti igitur à sanguine ferè & fla-  
ua bile, in nōnullis corporis partibus quæ ma-  
lè habent, superfluis, & in deterius versis con-  
stituuntur. Longi à pituita & atra bile, simili-  
ter vel naturalem habitum superantibus infi-  
25 gniter, vel in grauissimam qualitatem immu-  
tatis. Qui iam ex copia laborant, victus ratio-  
ne, vel inedia, vel purgatione, vel venæ incisio-  
ne curandi sunt. Qui ex abstinentia in mor-



C. GAL. PER G.

bum incidere, alimentis restituere conuenit.  
 Quib<sup>9</sup> cruditas & humorū acrimonia morbi  
 causam fecerūt, ijs fomētis & cataplasmatibus  
 concoctio paranda est. Acrida cōmiscere oportet:  
 & cibis boni succi, atq; humectantibus uti. 5  
 Cæterum quatuor in toto morbo, particulari-  
 busque accessionibus tempora auxilijs adfe-  
 rendis dicata sunt: Initium, incrementum si-  
 ue accessio, vigor, & inclinatio. Principio to-  
 tius morbi venæ incisio ad tertium quēque 10  
 diem conuenit: inde in totū abstinere triduo.  
 Venæ sectionem in initio recentiores ad tri-  
 duū vsq; statuūt. Veteres etiam post tertium  
 diem præcipiūt, si vires suppetant, & morbus  
 postulet. Nutrimēti tēpus à triduo iuniores, 15  
 antiqui non omnib<sup>9</sup>, sed ijs qui copia laborāt,  
 tum iuuenibus, tum senioribus instituunt. Pu-  
 eros statim morbo inuadente nutriunt. Præ-  
 terea illos quibus huiusmodi consuetudo vel  
 loci, vel aeris circūflui ratione est. Ab alimen- 20  
 to post triduum primum fomenta capitis &  
 præcordiorum ex usu sunt. Sequētibus diebus  
 cataplasmata & clysteres. Fomenta igitur in  
 præcordijs calida semper assumere oportet &  
 simplicia: cuminum, vel xylanethum: Ad ca- 25  
 put calefaciētia quidem in lethargo, & in om-  
 ni graui sopore: Refrigerantia in phrenitide,  
 & quauis acuta febre cōueniunt. Cataplasma-



ta quædam solo melle & oleo conficiuntur: vocanturq; μαλακτικὰ, quasi interpreteris emollientia. Quædam ex aqua cui oleum sit adiectum, fiunt, quæ ὤμηρ λύσις Græci nominant.

5 Alia hic insperguntur, veluti pollen, lini semen, & telis. CLYSTERES hydræ, læo, melle, sale, & nitro citius præparantur. Tēpus eorum ante nutritionē est, dum accessiones remittunt & inclinant. In continuis rectus cly-

10 ster locum habet. PHRENITIS est mentis alienatio. Notæ sunt: insania vehemens, temeraria manuum gesticulatio, floccorum & festucarū collectio, & febris acuta. Causam habet vt plurimum bilem. Constituitur in cere-

15 bro, vel eius membranis quas μίνυγγες appellant, vel (vt quidam aiunt) in septo transuerso. Curatio hæc conuenit. Initio, si præsciis fueris, venæ incisio, cucurbitulæ, ademptio per clysterem & abstinentiam. Vigente morbo, fo-

20 menta soporifera, medicamenta liquida quibus somnus accersitur, & humectantes cibi conducunt. ARDENS FEBRIS, quam Græci καυσωδὴ nomināt, ab Hippocrate quidem inter acutos, vt quartana inter longos morbos

25 refertur. A recentioribus non item. Oritur ex bile iuxta iocineris venas non nimis siccas. In curatione primum sanguinis missio: in statu frigida, tum aliorum quæ refrigerandi vim



C. GAL. PER G.

obtinēt, potio confert: vel epithema, cuius-  
modi ex feruenti hydralæo præparatur. A N-  
G I N A est circa ceruicem inflammatio. Eius  
speciem vnā Græci *κυνόγχην* appellāt, cum  
lingua intus & fauces cum rubore intume-  
scunt. Subito hominem strangulat. Alteram  
*συνόγχην*. Hæc in exteriorem partem incum-  
bit, eoque minus strangulat, minúsq̃ peri-  
culosa est. Vterq̃ affectus vel à bile, vel pitui-  
ta falsa nascitur. Sed febre acuta modo acce-  
dēte, modo nulla. Remedium & commune,  
& præsentaneum est sanguis statim in princi-  
pio missus: Deinde medicamenta pituitā edu-  
centia, & cerata foris imposita. Asclepiades vl-  
timum auxilium posuit, de quibus metus est,  
ne strangulētur, superiorem gutturis partem  
incidere. P L E V R I T I S laterum ab interiore  
parte inflammatio est. Huic febris acuta, do-  
lor vehemens, & tussis accedit. A bile potissi-  
mum constituitur. Præsidio est matura venæ  
incisio: Deinde cataplasmata & sicca fomēta,  
nēpè milij & salis: Postremo medicamēta in-  
trinfecus purgātia, quæ *πλευρητικά* nomināt.  
Obseruanda vero in his sunt vētris profluuia.  
P V L M O N I S vitium (Græci *πνευμονία*)  
vocant, nonnullis authoribus inflāmatio gra-  
uis est, idēq̃ grauitate ostenditur. Quibusdam  
pulmo inflammationem pati non posse vide-



# INTROD. SEV MEDICVS. 25

tur: sed vicina eius loca. Habet autem hic morbus febrem acutam comitem. Eadem ipsius causa, quæ lateris dolorem concitat. Alijs tamen pituita. Remedium ferè huic cum superiore malo cõmune est. **S T O M A C H I A F F E C T V S** est, quæ Græci κορυσίακος appellât, cum eo languente, inter febricitandum corpus immodico sudore digeritur. Accidit ferè ex immodica abstinentia, vel parum tempestiua venarum sectione: vel cum aliquid præter rationẽ corpori adimitur. Quare alimento, quod promptam recreandi, calefaciendiq; vim obtinet, succurrendum est. Potu ex vino & niue dato: cibo qui ex valentiore materia est, & stomachũ corroborare potest. Est cum visceribus inflammatis, potissimum iocinere hic morbus eueniat. Atq; hic contrarij ablationis, & cataplasmatum quæ inflãmatis adhibentur, vsus erit. **A R Q V A T V S** est, quem & regium morbum nostri, ικτέρος Græci nominât, bilis in summam cutem redundantia. Accedit illi interiorum adustio, stomachi vitium: interim febris acuta, interim nulla. Si præcordia ex inflãmatione tument, cataplasmata primum desiderant. Si copia laborant, venæ sectionem. Sin minus medicamẽta quæ bilem euacuent, aut alui ductione, aut per vriñas, aut sudores, aut per nares. **C H O L E R A**

e. j.



C. GAL. PERG.

duplex est secundum Hippocratem. Altera humida: in qua (viti omnes norunt) simul et deiection, & vomitus est: præterque hæc inflatio est: bilis supra infraque erumpit: intestina torquentur. Accedunt conuulsiones: sæpe etiam manus cruræque contrahuntur. Remedio contractionibus sunt fomenta calida: balneum post expurgationem: tum alimenta quæ ex facili ponuntur, digerunturque, & stomachum adiuuant. Alteram siccam choleram vocat Hippocrates 10 ab eadem prouenientem causa, in ipsa demque consistentem: At citra ventris fluorem & vomitum. Ideoque resolutionem per cataplasmata requirit: nec adiectione, sed inedia opus est. **I N T E S T I N O R V M** morbi duo consistunt: 15 quorum alter tenuioris: alter plenioris inflammationis est. Hunc εἰλεον, illum κωλικὴν δ/γέθειν nominant. Recrementum, nec inflatio infra transmittitur. Hinc quod ex nullo loco transitus est, dolores vehementissimi, & reuolutiones 20 ventrem exercent. εἰλεος autem dispositione & accidentibus acutior, magisque periculosus est. Alterutro autem morbo extremè laborantibus vomitus biliosi concitantur. Auxilium est prioris sanguinem mittere quamprimum: abstinentia, & cataplasmata inflammationem discutientia. Efficacius iuuant medicamenta, quæ κωλικὰ nominant: interiores partes relaxan-



tia. Nam dolores auferunt, somnū conciliant,  
 & aluum mouent. A P O P L E X I A ex humo-  
 rum crassorum copia generatur, qui principes  
 cerebri vētriculos, vnde corpori sentiendi mo-  
 5 uēdiq; facultas aduenit, affatim implēt. Quā  
 obrem eorū qui huic malo sunt obnoxij (atto-  
 niti Latinis vocantur) corpus simul & mens  
 stupet. Hippocrates de hoc vitio scribit: Apo-  
 plexiam, inquiens, validam soluere nemini li-  
 10 cet: Imbecilem haud facile. Sanguis mitten-  
 dus statim iam oppressis, modo & ætas con-  
 sentiat, & vires sustineant. T E T A N V S, Opi-  
 sthotonus & emprostotonus neruorum mor-  
 bi graues existunt. Verū vterq; posterior, spe-  
 15 cies est conuulsionis neruorum, qui à capite  
 descēdentes, corpori motū distribuunt. Nam  
 si viscosi humores eos obstruant, affectio ta-  
 lis oritur. Quę se scapulis caput annectat, quo-  
 minus possit annuere ὀπισθότονον, cum inen-  
 20 tum pectori contrahit vt remouere nequeas,  
 ἐμπροσθότονον: cum rectam & immobilem cer-  
 uicem tendit, τέτανον Græci appellant. Sanat  
 venæ sectio, si copię suspicio est. vt videre li-  
 cet apud Hippocratē, in illo, qui prolapsus hu-  
 25 mi vulnus in caput acceperat. Medetur enim  
 eis frigida infusio, si æstas sit: præsertim si non  
 gracilis, sed quadratus existat æger. Nam ca-  
 loris repercussus excitat. Multi sanè ceratis



# C. GAL. PERG.

paulatim recalfaciētibus & relaxantibus vtun-  
 tur : adhæc illitu æqualiter . Postremo lanas  
 soli expositas, fomenta & cataplasmata cali-  
 da ceruici imponunt. LONGI MORBI in-  
 terioribus accidunt hi:cephalæa, morbus co- 5  
 mitialis,vertigines oculorū,caligationes,insa-  
 nia,melancholia,lethargus,destillatio,rauci-  
 tas,grauedo,sanguinis eruptio,suppuratio in  
 thorace,tubes,Abcessus in medio latere,ab-  
 cessus ī clauiculis,iocineris affect⁹,tenesmus, 10  
 dysenteria,lumbrici siue lati,siue teretes,co-  
 xarum dolor,articularis morbus,podagra,ele-  
 phantia ad exteriores partes spectare videtur.  
 CAPITIS DOLOR INTERNVS est,  
 quem Græci κεφαλαία appellāt:modo totum 15  
 caput per accessiones affligit,modo partem:  
 atq; tunc ἐτεροκρανία nominant.Pituita eum  
 generat.Auxilium vtriusq; est sanguinis de-  
 tractio,vel cucurbitulæ occipitio impositæ:e-  
 ductio pituitæ,per aluum purgatio,& epithe 20  
 mata quæ inter cataplasmata,vel malagma-  
 ta,vel epichrismata scribūtur.MORBVS CO-  
 MITIALIS,quem & sacrum vocant,in ner-  
 uorum qui à capite descendentes,sensum mo-  
 tūque vniuerso corpori distribuunt,origine 25  
 consistit. Caussam eius Plato & Hippocrates  
 pituitā & bilem atram indicāt.Homo subito  
 concidit:quoniam sentiendi,mouēdiq; mea-



# INTROD. SEV MEDICVS. 27

tus obturatur, idq; ob humorum commotionem, quæ à neruorum conuulsione prouenit. Qua de causa interim vrina sine voluntate prorumpit. Præsidium maximum ad hominis curationem adfert natura florēs impuber-  
 5 tatis, & morbum ad iudicationē humoribus natiuo calore exiccatis perducit. Qui pubertatem exceſſerunt, raro aut nunquam sanantur. CALIGINES oculis offusæ & VERTI-  
 10 GINES cognata sunt vitia morbo comitiali, ab eisdemq; causis prodeunt, atq; easdem sedes occupant. Hoc tamen intercedit discrimi-  
 nis, quod illæ extrinsecus accidāt: ob quod fa-  
 cilius quàm hic curantur,alui ductione, apo-  
 15 phlegmatismis, & vomitibus partim à cibo, partim ieiunis adhuc excitatis. Omnium ma-  
 ximè veratro succurritur. MENTIS ALIE-  
 NATIO duplici specie insigni constat. Hanc  
 Græci *μανία*, id est insaniam: illam *μελαγχολία*,  
 20 *λία*, id est atrambilem, appellant. Complures  
 harum existunt differentiæ, nominum adhuc  
 indigæ. Constituitur itaque omnis animi stu-  
 por i toto capite. Causa insanix atra bilis est.  
 Ob hoc, qui tali vitio laborant, cum impetu  
 25 confurgunt, & violenter quædā manu faciūt.  
 Melancholia nascitur ex atra bile, humore fri-  
 gido & graui. Vnde melancholici demissi, tri-  
 ſtesq; apparent: de omnibus suspitiosi: homi-

e. iij.



C. GAL. PER G.

num consuetudinem oderunt: solitudine gaudent. Quemadmodum Bellorophōtes à poeta describitur:

Nam cito longa maris remeabat littora solus  
Cor edens curis, hominum vestigia vitans. 5  
Medetur per aluum purgatio: maximèq; vomitus.  
adhuc his magis vtrunq; veratrum soluit.  
LETHARGVS morbus est phrenitico contrarius.  
Est enim marcor, ac inexpugnabilis penè dormiendi necessitas. Huic vitio ob- 10  
noxij omniū quæ dicunt obliuiscuntur. Atq; hæc in febre accidunt.  
Locus affectionis caput est. Nam in membranis cerebri constituitur.  
Causa ipsius pituita est: humor frigidus, qualitate sua somnum ac torporem inducens. Cu 15  
ratur contrario modo quam phrenitis. Fricantur superiores corporis partes acribus quibusdam & pungentibus: tum ea adhibentur, quæ odore foedo excitāt, mouentq;. Cibi similiter digerentes, secantēsq; pituitam. Fomenta ca- 20  
piti admouentur, & cataplasmata quæ exiccan di vim obtinent. Aliquando præcordijs. Crebro nanq; hæc inflammatione vexata, nervorum quoq; in capite principium constringūt grauāntq;. HVMOR, à capite oppleto destil- 25  
lat interdum in nares: interdū in fauces: aliàs in pulmonem. Atque has tres species Latini grauedinem, raucitatem, & destillationem:



INTROD. SEV MEDICVS. 28

Græci κόρυζα, βρόγχος, & κατάρρευς, siue κατὰ  
σαγμὸν nominant. Grauedini itaque facile &  
breui succurritur: deinde raucitati: Modico fa-  
nè & calido victu, qui tamē validi generis ex-  
5 istat. Destillatio in thoracem non ex facili cu-  
ratur: imò sæpe immedicabilis est. Nam ab ea  
acri & falsa partibus exesis, sanguinis eductio  
sequitur. Cui⁹ tres causæ referuntur. Vel enim  
vasa erosionem passa sunt, ideoque sanguis in  
10 arteriam descendens per os reijcitur. Vel ru-  
pta sunt violenter: vel ob imbecillitatem non  
continent, sed ad aperta eū transmittunt. Dif-  
ferunt nōnihil sanguinis excretio, & reiectio.  
Hæc etenim vel à pulmone, vel aspera arteria  
15 prouenit. Illa à stomacho, & sanguis apparet  
nigrior. Qui ex thorace reijcitur, flauus ma-  
gis & spumans. Deinde hic cum tussē: Alter  
sine illa spuitur. Sæpenumero etiam à capite  
per palati foramina ī os defertur sanguis: præ-  
20 betque eductionis falsam imaginem. Loci, ex  
quibus sanguis educitur, tres sunt. Primus iu-  
xta tonsillas: vnde minore cum periculo san-  
guis reijcitur, faciliusq; sistitur. Secundus aspe-  
ra arteria: atq; hic morbus curationem diffi-  
25 culter accipit, plenusque periculi est. Tertius  
pulmo, vbi minus omnibus præsidij, magis  
periculi affectus habet. Comitatur enim ma-  
ximè suppuratio & tabes, si Hippocrati fidem

e. iij.



„ adhibemus: Cuius verba hæc sunt: Sanguinis  
 „ spuitionem pus, hoc tabes, tabem mors sequi  
 „ tur. Nonnulli etiam ex latere sanguinem edu-  
 ci arbitrantur. At hoc ambiguum est. Salus vi-  
 tij huius est, sanguinem reprimere: vel venæ s  
 sectione aliò ducere: idq; potissimum in iuue-  
 nibus: vel posca sistere, vel inædia copiam eius  
 imminuere, vel simplici quodam medicamē-  
 to, vt acatia, hypocystide, balauustio, arnoglos-  
 si succo, atq; id genus alijs. Vomicæ præfidiū 10  
 vetus sunt ferramenta candentia, quæ thora-  
 cem exciccent: fluorēmq; in exteriores partes  
 dirigent. Iuniores consueverunt mitigare cata-  
 plasmatibus, & alleuigantibus. Deinde repurga-  
 re medicamētis per os assumptis, priusquam 15  
 corpus inficiatur. Inscribuntur autem propriè  
 pharmaca ad purulētos. Quæ suppurationes  
 medio latere constituuntur, resectæ propriè ad  
 linamentum humoris excretionem habent.  
 Quæ enim si vniuersim fiat, hominem inter- 20  
 imit. Accidunt vero vomicæ quoq; sub trans-  
 uerso septo, quæ (quia se intus oculunt) absces-  
 sus nominantur, non ex æquo periculosi, nec  
 curationi resistentes: plerunq; intus rupti hac  
 excernūtur, vel partibus exterioribus diuisis. 25  
 Diocles memorat etiam pectoris suppurationes  
 interim per rupturam arteriæ, quæ ad re-  
 nes ac vesicam tendit, illapsas, ibi simul cum



# INTROD. SEV MEDICVS. 29

vrinis excerni. T A B E S, morbus periculosissi-  
 mus, quā Græci φθίσις nominant, à capite ori-  
 tur: inde in pulmonē vel thoracem destillat,  
 colliquatq; corpus misere: Difficilis eius salus  
 5 est: aut nulla. Lactis vsus potui datur dum cō-  
 sistit. Loca ficciora conueniunt. Superior Ae-  
 gyptus & Libya maximè huic malo meden-  
 tur. Hippocrates tabis cuiusdam coxēdicum  
 meminit, ισχιαδίκη vocās, qua in vomicis cir-  
 10 ca os sacrum accidentibus corpora collique-  
 scūt. Similiter alterius renum, cui νεφριτική no-  
 men dedit. Porrò iocineris & lienis inflāma-  
 tiones si in pus vertuntur, & ipsæ mediocri-  
 ter corpus consumunt. At hæ suppurationes  
 15 multo citius curantur, minúsque periculosæ  
 sunt, quàm quæ pulmonem affligunt. Verum  
 si minus in vomicas mutantur inflammatio-  
 nes, sed crudæ duræq; permanserint, malum  
 habitum corpori afferentes, tandem aquam  
 20 inter cutem cōciliant. Quatenus autem sim-  
 plices extiterint in iocinere, febres continuas  
 afferūt. In liene, quartanas vt plurimū. Nam  
 huius speciei caussa bilis atra est, quæ in illo  
 tanquam vase continetur. Vnde quartanæ au-  
 25 xilium est, ante rigorem summas partes pro-  
 pter humoris frigiditatem fomentis tueri. In  
 remissionibus vomitum mouere prodest. A-  
 QVAE INTER CVTEM, quam Græci



C. GAL. PERG.

ὕδρωπα vocāt, tres species sunt neotericorum  
sententia. Primā ἀσκίτην. Secūdam τυμπανί-  
την, Tertiā ὑποσπληνικήν, vel λευκοφλεγματίαν  
nominant. Hippocrates duas statuit. Nā τυμ-  
πανίτης & ἀσκίτης eiusdem speciei sunt. Quo- 5  
niam in vtraq; nutrimentum in aquam reda-  
ctum inter intestina & peritonæum transfun-  
ditur. Sed in hac aquæ plus quàm spiritus in  
vnum intus cōtrahitur. In illa copiosior spiri-  
tus, minor humiditas est. In reliqua solidæ to- 10  
tius corporis partes in aquæ naturā transeūt.  
Hanc Hippocrates immedicabilem esse scri-  
bit. C A V S S A vero cuiusque hydropis est au-  
thore Erasistrato inflammatio iocineris & lie-  
nis, temporis spacio indurata. Nam cum ali- 15  
menti in his visceribus confectionem, atq; in  
totum corpus digestionem impediat, in aquæ  
substantiam ipsum commutat. Quod ita re-  
frigeratū inter intestina & peritonæum trans-  
mittitur. Hoc quoq; malum Hippocrati sa- 20  
lutis spem nullā habet. Quod si absq; inflam-  
matione hydrops, præsertim ἀνασάρκεια eue-  
niat, calore genuino refrigerato, nec alimen-  
tum in venis amplius continente, sanguis ca-  
loris inops aquæ naturam induit: & ex venis 25  
ceu oleum ex vtribus defluit. Quousq; enim  
sanguis omnino in venis est, ab earum tunica  
continetur. Vbi vero in eo pingue exuperaue



# INTROD. SEV MEDICVS. 30

rit, vt in obæsis, sanguis effusus adipem gene-  
 rat, aut in aquã versus, aut dum non contine-  
 tur, diffluit in locũ, qui intestina, & interiorẽ  
 abdominis mēbranã interiacet, aut per vniuer-  
 5 sum corpus diffunditur. Tollũtur duo alij hy-  
 dropes vel malagmatis exiccantibus, vel me-  
 dicamētis vrinas cientibus, vel hypelatis pur-  
 gandi facultate præditis. RENES affecti do-  
 lores magnos pariunt. Locus autem male ha-  
 10 bens non ex facili potest discerni, quòd exte-  
 rioribus partibus cohæreat: laxiũsque intesti-  
 num, κῶλον appellant, ipsis vicinum sit. Qua-  
 re cum offenduntur, vel externarum partium  
 inflāmatio, vel cōli affectio esse apparet. Non  
 15 rarò eiusdem intestini consensu renes dolent.  
 Vitia autem quæ in eis consistunt hæc sunt:  
 inflammatio, exulceratio, calculi, vrinæ destil-  
 latio. Cum inflammatio renes exercet, nihil  
 per vrinam excernitur: sed dolores excitantur  
 20 potius, non exactè locum dolentem ostēden-  
 tes ob eam, quam dixi, rationem. Verum in-  
 tolerabiles: quippe qui nec cataplasmatibus ce-  
 dant, nec imminutione per cucurbitulas facta  
 remittāt. Sola pharmaca nephritica intus ac-  
 25 cepta præsidio sunt. Si exulceratio eos infe-  
 stat: interdum purulenta per vrinas excernun-  
 tur, interdum cruenta. Cum inest calculus ali-  
 quādo cruēta, partibus videlicet ab eo exaspe-



C. GAL. PERG.

ratis eijciuntur. Aliquando arenulæ in vrina  
 subsident, si friabilis sit lapis, vel etiam recens  
 modo nascatur. In remissione sanguinolenta  
 vrina redditur, quasi nondum segregata. VESICA  
 AE AFFECTVS hi sunt: vrina spontè  
 profluēs, pytiriasis, calculus, exulceratio, qui-  
 bus coles maximè conflictatur. His accedit  
 vrinæ suppressio, eiúsque difficultas, & stillici-  
 dium. Ex eisdem vero, alijsque caussis profici-  
 scūtur. Græci prius vitium *ισχυρία*: alterum *10*  
*δυσχυρία*: tertium *σπασχυρία* appellant. In-  
 flammationis notæ sunt circa pubem dolores,  
 vrinæ excernendæ difficultas. Soluitur cata-  
 plasmatis, fomētis, & à cibo abstinētia. Quod  
 si excedat, sanguinē per venam mittere conue-  
 nit. Exulcerationis indicia sunt, sanguinolēta  
 reiectio interim, interim purulēta, nōnunquā  
 muccosa, & circa pubem dolores. Auxiliātur  
 epithemata: maximè dulcis bonique succi ali-  
 mentū. Adhæc quæ intus adhibētur, & byssi-  
 ni medicamētum. Relaxationē vesicæ innuit  
 vrina cum citra mingētis voluntatem effluit.  
 Difficilem morbus curationē aut nullam re-  
 cipit. LAPIDEM in vesica esse, digiti in a-  
 num immissi deprehendunt. sed ita vt index  
 ad mediū in summo reflectatur: atque in prio-  
 rem vesicæ partē, vbi & lapidem innatantem  
 contingunt, referuntque in vesicæ cervicem. *25*



# INTROD. SEV MEDICVS. 31

CALCVLORVM differentia plures sunt:  
 quidam enim illorū adnati sunt: alij possunt  
 auferri. Rursus aliqui vel molles: nonnulli du-  
 ri sunt. Itaque magna ex parte adnati difficul-  
 5 ter curantur. Ex alijs autem molles dissoluen-  
 tibus medicamentis cedunt. Duros & dissolu-  
 biles chirurgi tollunt, cutem diuidentes super  
 vesicæ ceruicem. *ισχυρία* summa est vrinarum  
 retentio. *σπαγγυρία* vrinæ stillicidium. *δυσχυ-*  
 10 *ρία* vrinæ difficultas. Atq; hæc multis è causis  
 proueniunt. Aliquando calculo vesicæ cer-  
 uici impacto, aut meatu in totum obstructo:  
 vel si intus quippiam relictum sit, aut cerui-  
 ci insideat. Vrinæ retentio propter vesicæ in-  
 15 flammationem nimiam, aut repletionem im-  
 modicam accidit, vesica scilicet ad excretionē  
 imbecilli, aut ceruice vehementer ex vrina-  
 rum acrimonia contracta: aut ex grumis san-  
 guinis iter recludentibus, aut ex humorum  
 20 crassitie. Hæc medicamentis resoluentibus o-  
 portet discutere. Plenitudinem vacuare ferra-  
 mento, quod Erasistratus *καθετήρ* nominat:  
 Romanorū literæ S simili. S T O M A C H V S  
 siue naturaliter, siue male affectus sit, ventris  
 25 & intestinorū principium est. Eius vitia sunt:  
 inflammatio, exulceratio, sanguinis educ-  
 tio, exhalatio, humiditas, fastidiū, alimēti incōti-  
 nentia. Inflammationē notat dolor incumbēs.



## C. GAL. PER G.

Succurritur fomētis & cataplasmatibus, alimentis quæ nutriant, & facile possint digeri. Exulcerationem in stomacho notant propriè putredo, mordicatio, deglutiendi difficultas. Auxiliatur his extrinsecus imposita, cibiq; probè succulenti. Sanguinis excretio ijsdem medicamentis sistitur, quibus ex pulmone eiusdem reiectio. Exhalationem dissoluunt evaporationes, & quæ ructus mouent. Humiditatem siccorum esus, & absinthij potio tollunt. 10  
Cibi fastidium ex pituita circumiacente oritur, ideòq; exiccare illam ex usu est. Aut à bile supernatante: Vnde stomachus purgandus est, aut naturæ impotenti functionem appetitoria reddenda. Nam oculi quoque propter 15  
spiritus visorij imbecillitatem hallucinantur. Aduersum victus fastidium huiusmodi adhibenda sunt, quæ appetitum prouocent, suppeditentq;. Stomachus autem non continet accepta propter humiditatem, maximè impotentiam ac imbecillitatem, sicut dimissa manus non continet apprehensa. Expedit igitur 20  
corroborare, fortiorèmq; ipsum reddere, tum vniuersū corpus reficere. VENTREM multa vitia stomacho communia infestant præterquam appetentiæ prauitas. Sed concoctionis male obita functio ventriculo propria tribuitur, vt quæ potissimum in eo administre-



# INTROD. SEV MEDICVS. 32

tur. Quem affectū profluuium sequitur. Reliqua igitur pari modo cum ijs quæ stomachum cruciant curabis. FLVXVS exactè disquirendus est, cur alimento incocto accidat.

5 Et si inflammatio eam pepererit, cataplasmatibus & fomentis occurratur. Si pituita humiditatis parens, victus ratione exiccanda est. Si bilis exuperet, eam purgare vtile est. Si ex imbecillitate provenit vt infirmis, robur corpori faciendum est. Si ab ipsa qualitate eorū quæ

10 cruda assumpta sunt, vel quæ cōsumi non possunt, vel aliter habent, desperanda talium curatio est. **INTESTINORVM** tormina, *δυσεντερία* Græci nominant, generantur in ventris profluio, humoribus temporis processu corruptis, erodentibus, & exulcerantibus intestina. Fit etiam sine fluxu, primum ab humore acri intestina intus exedenti. Est cū in morbi decessione *δυσεντερία* contingat, quam curari Hippocrates prohibet, ne alium quempiam morbum maiorem accersat. Illam, quæ ex fluore nata est, reprimentibus & sistentibus sanguinem medicatur. Aliam, cuius origo ex acris cuiusdam humoris mordicatione

20 est, leniētibus, quæcūq; similibus exulcerata mitigare possint. Diuturno tamen morbo pestifera & putrida solent deijci: tum profunt immixti pastilli ex sandaraca, calce, auripigmen-



## C. GAL. PERG.

to, atq; id genus alijs compositi. Vbi vero non  
 fit consueta deiectione, non his vtendū est: quo-  
 niam conuulsionem faciunt. Quod si talis in-  
 testinorū exulceratio in superiore parte con-  
 sistat, pastillorum nullus vsus est. Non enim  
 statim ad affectos locos perueniunt. Vbi sanos  
 contingunt, perniciem eis faciunt. Verū me-  
 dicamentis vtendum est, quæ superioribus lo-  
 cis conueniunt: quorūmq; titulus est aduer-  
 sus dysenteriam inditus. Ex torminib<sup>9</sup> inter-  
 dum **INTESTINORVM LEVITAS** o-  
 ritur, quæ propter multa vlcera nihil cōtinēt.  
 Quamobrem medicamenta hic nihil promo-  
 uent. Vlcers nancq; ægrè sanescunt. Si vero ex  
 intestini imbecillitate contigerit, tum quoq; **15**  
 periculosa est, nec ex facili tollitur. Remediū  
 autem erit, si curationem moliaris, robur vni-  
 uerso corpori ac intestinis adiungere. Cate-  
 rum caussa morbi pituita est, intestinis lubri-  
 citatem illuendo generans. Succurrit inædia: **20**  
 & cibi pituitæ contrarij. **TENESMVS** pro-  
 priè morbus est recti intestini. Hoc enim in-  
 flammatione laborans, cōtinuæ intentiones,  
 & frequens desidendi cupiditas exercet. Pro-  
 sunt ei fomēta parte inferiore adhibita, astringen-  
 tia, tum alimentum ex valenti materia &  
 reprimens. Qz si perseueret, nihilq; imminua-  
 tur, ptissanæ cremore, & hircina adipe vten-



# INTROD. SEV MEDICVS. 33

dum est. L V M B R I C O R V M qui intestina  
 excruciant, triplex est species. Quidam enim  
 teretes, palmi longitudine, vel etiam maiore  
 ad stomachum usq; proserpunt. Quidam bre  
 5 ues, & maiusculis vermibus similes, ἀσκαρίδ  
 ες Græcis appellantur. Rectum vero intesti  
 num occupant. Nōnulli lati & oblongi adeo,  
 vt in totum exporrigantur intestinum. Græ  
 ci vocant κνείας simul & ταινίαν. Teretes ita  
 10 que ad remedia faciles, maximè pueros: Asca  
 rides eos, qui sub pubertatem sunt, infestant:  
 nec præsijs cædunt, nec excernuntur, nisi ci  
 bis acriorib⁹, & medicamētis diapicram com  
 positis, oleoq; cum vino copiosissimè adiecto.  
 15 C O X A R V M dolores, articulorum vitia, &  
 podagræ sola inter se magnitudine differunt.  
 Cæterū caussis & locis, qui affectum primum  
 sentiunt, ijsdem constant. Pituita nanq; mor  
 bum plerunque constituit. Nerui sustinent,  
 20 quibus articuli conferuntur, motūque reci  
 piunt. At coxæ dolor, quē Græci ισχιάδα no  
 minant, in ipsius articulo ortus ad talos usq;  
 non raro extenditur. Præsidio erit sanguis ex  
 talo missus, & cucurbitulæ coxis admotæ: cly  
 25 steres acres, quiq; intestinorum tormina quo  
 dam modo faciunt. Adhæc cataplasmata aco  
 pa, & malagmata adhibita profunt. P O D A  
 G R A solos pedes affligit: in statu febris inten  
 s. j.



tio est, eoque refrigerantibus opus est. In decli-  
 natione torpor cum frigore hominem occu-  
 pat, ob quod calefacientia conducunt. ARTI-  
 CVLORVM vitia, prædictis similes affectus  
 sunt, medicamenta therapeutica, tepefacien-  
 tia, & victus ratione variam desiderant. MOR-  
 BV S quem Græci ἐλεφαντίασιμ, vel ἐλεφαντιάμ  
 vocant ab elephanti similitudine nomen for-  
 titus est. Nam qui hoc vitio laborant, sum-  
 mam cutem aquabiliter crassam, duram, can-  
 cellatam, quasiq; squamis quibusdā elephan-  
 torū modo exasperatam habēt. Originē mali  
 excitat pituita crassa, & atra bilis, vel mucco-  
 sa maximē inhærescēs. Illi enim humores fe-  
 ritatem ipsam denunciant. Quare solum ve-  
 ratrum siue nigrum, siue albū, præsentaneum  
 elephantis est remedium. IMPETIGINIS  
 duæ species sunt, quæ cutem molestant. Vna  
 tolerabilis, mitiorq; est. Altera difficilius tol-  
 litur: ideoq; ἀγρία, id est feram Græci appel-  
 lant. Squamulæ in his ex summa cute descē-  
 dunt: sub quibus locus rubicundior, ferēq; ex-  
 ulceratus apparet. Gignitur affectus à pituita  
 falsa & flava bile. Vnde ceu in falguginum va-  
 sis fictilibus, ex cute oriuntur squamæ. Succur-  
 ritur medicamentis pituitam mouentibus, &  
 quæ extrinsecus corpori illinuntur. LE PRA  
 quoq; cutis vitium est, sed magis subalbidum,



## INTROD. SEV MEDICVS. 34

asperiusq; apparet spydracijs videlicet: ea sunt paulo duriores pustulæ in cute summa exortæ. P S O R A vero scabies exulcerata magis est. Pituita falsa vtrunq; malum propriè pro-  
 5 ducit. Pharmaca pituitam cientia, tum quæ extrinsecus illiniuntur, quibus ad lepram & scabiem titulus est, ijsdem succurrūt. V I T I-  
 L I G O quam Græci ἄλφοι vocant, duas ha-  
 bet species: Leucum & Melanem. Hic ab atra  
 10 bile generatur, ob quod magna ex parte me-  
 lancholica subueniunt. Leucus à pituita non falsa. L E V C E habet quiddam simile alphi  
 leuco: sed magis colore terrā albidam refert.  
 A lepra variat: quòd leuior hic cutis, minúsq;  
 15 aspera quàm in illa sit. Omnia huiusmodi cu-  
 rant medicamenta pituitæ trahendæ idonea,  
 tum purgationes foris adhibitæ.

## DE CVRATIONIS PER ME-

### DICAMENTA DIVISIONE.

20 **M**edicina duplex est: prima inte-  
 riores morbos curat, qua potiss-  
 simū victus ratione sanans vti-  
 tur. Altera exteriores, citràque  
 illam manu nihil peragitur. In-  
 25 teriorum medicaminū species duodecim ex-  
 istunt. Quædam cephalica, quædam stomati-  
 ca dicuntur: Alia concoquunt: alia tussim sa-  
 nant. Alia anodyna quæ dolorē leuāt vocant,

f.ij.



C. GAL. PERG.

alia alexipharmaca sunt, alia purgant. Non-  
 nulla propriè ad iecur dolens, inscribuntur.  
 Sic ad lienem, ad renes affectos. Est quæ ad-  
 uersus vesicæ calculos & vlcera nomen habet:  
 similiter ad vuluam. Iam vero stomatica sunt 5  
 quæ ad cicatrices cruentas, putridas, erosas, &  
 dentes faciunt. Eodem referuntur quæ aphtas,  
 & crustas, tum quæ vuam descendantē sanāt.  
 Quæ cōcoquunt partim ad stomachi vel ven-  
 triculi imbecillitatem conducunt: partim ad 10  
 horum inflationē. Partim etiam laterum do-  
 lores, vel pulmonis morbos tollunt. Partim  
 tabidos salutē restitunt: & spirandi difficul-  
 tate maxima distorsos, vt spirare sine sono &  
 anhelatione non possint, ἀσπυκτικὲς Græci no 15  
 minant. Partim eos qui non nisi recta cerui-  
 ce spiritum trahunt, ὀρθοσπονικοὶ vocantur. A-  
 liqua ex his asperitatem arteriæ, & vocis im-  
 pedimentum auferunt. Porro anodyna nunc  
 renum affectus, nunc ventris profluvia, aliās 20  
 intestinorum tormina, aliās plenioris, tenuio-  
 risq; intestini mala: cōmuniter omnia quæ-  
 uis dolorem mitigant, extinguuntq;. Alexi-  
 pharmaca simplicia alia ad aliud venenū vsur-  
 pamus. Theriace aduersus omnia, & prius, & 25  
 post sumitur. Inter purgantia quædam per su-  
 periores corporis partes agunt: quemadmo-  
 dum quæ veratro constant: vomitumq; cien-



tia. Per inferiores scammonia, aloe, elaterion, colocynthis, euphorbium, coccum gnidium, atq; his similia purgant. Tertio ordine ab his ponantur, quæ lumbricos latos repellunt: cuiusmodi medicamentum est, quod cerui cornu, menta, & pipere præparatur. Est & quarta species caput tantum per os atque nares purgantium, quæ in capitis, oculorumq; doloribus propriè sumuntur. Adhæc quæ in arqua-  
 10 to crebrò in usu sunt. Conuenit autem superior purgatio morbis lōgis propulsandis. Tēpus harum est, cum morbi intermittunt. Inferior acutis, vt laterum pulmonisq; affectibus. Tempus earum omniū & particularium  
 15 accessionū remissio est. EXTERIORVM REMEDIA vndecim species cōtinent. Alia discutunt, alia concoquunt, alia cruentis statim imponuntur, alia pus mouent, alia repurgant, alia implent, alia reprimunt, alia cicatricem inducunt, alia oculis, alia vniuerso corpori adhibentur, alia adurunt, erysipelatis, her-  
 20 petis, carbunculis idonea. Alia sunt quæ illi-  
 nuntur, acopa, & excalfacientia, ad neruorū resolutiones, articularū morbos, podagras, teta-  
 25 nos, opisththonos, omnemq; neruorum rigorem. Alia pustulas in summa cute oriētes, leucen, alphum, impetiginem, & lepram purgāt. Quæ digerunt & concoquunt, tuberculis, &

f. iij.



cuilibet id genus abscessui auxilio sunt. Dige-  
 rentia constant sale: nonnunquā nitro, vt Cte-  
 siphonis compositio testatur. Concoquentia  
 refina, galbano, ammoniaco, thymiamate.  
 Enæma pharmaca fusci coloris ad recētia cor-  
 poris vulnera valent. Quæ propriè viridia &  
 nigra sunt, vt barbarū, capitis mala & canum  
 morsus sanant. In vlceribus partim pus edu-  
 centibus vtendum est. Inflāmatis leuia con-  
 ueniunt, vt tetrapharmacum; Sordidis repur-  
 gantia, vt viride relaxans. Cavis implentia,  
 supercrescentibus reprimentia, quæ ex mysi  
 & squama conficiuntur, in vehementi sangui-  
 nis fluore sistendo non parum efficacia. Adu-  
 rentibus interim in diducendis partibus, ac a-  
 periundis vtimur: velut in abscessuum tumo-  
 re: interim cum palpebræ summa cutis rela-  
 xatur, & procidit. Aliquando in capitis mor-  
 bo difficillimo, quē κεφαλαία à Græcis voca-  
 ri diximus, per altas crustas humores in exte-  
 riorem partem educentes assumimus. Adu-  
 runt lixiuium, calx viua, auripigmentum, san-  
 daracha, alumen, atq; id genus alia. Ex cepha-  
 licis medicamentis aliud ad furfures capitis,  
 sordes, & papulas valet. Alia cephalalgiam,  
 & heterocraniā leuant. Aurium remedia par-  
 tim earum inflammationem, partim exulce-  
 rationem, partim influxum, partim grauem



audium, partim contusionem iuuant. Oculorum pharmaca septē species habent. Quædam enim ad incipientes lippitudines, quæ *δλε γλαυκίς, & δλε κρόκς, & κυκνάρις* Græcè inscribuntur. Quædam ad eorū affectus, vt nardina, & theodocia appellata. Quædam ad fluorem, quæ ex libano, acatia, & ericæ fructu cōponuntur. Quædam ad scabritiem, vt metallica: nempè vstum es, chalcitis, & æris squama. Quinta ad siccam lippitudinem, & scabiem collyriorum species est: tum siccorum oxydercicōn, id est visum exacuentium, quæ in superiorum numero locantur. Sexta humidorum quæ ad suffusiones inscribūtur, ex felle & hyæna potissimum composita. Septima plasmatum species in oculis vehementer inflammatis & dolentibus vsurpatur, ex meliloto, dulci aqua, & teli similibusque confecta. Oblinimus palpebras initio repurgantibus, & cuiusmodi sunt diaglauciu, & diacrocu medicamina. Etiam solo ipso glaucio. Interioribus exiccantia, & lenia ad mouemus, vt nardina & theodocia. Quæ vero ad colorem decorēque formæ conciliandum illinūtur, qualia hydychroo, & sandyce constituuntur, non medicinæ, sed cultus, ac elegantiae sunt propria.



C. GAL. PERG.  
DE OCVLORVM AFFECTIBVS.



Affectus qui totum oculum exercent, hi sunt: taraxis, lippitudo, epiphora, inflammatio, tumor, inflatio, durities, chymosis, carbunculus, strabismus, contractio, tremor, myopiasis, gangræna, putredo, vlcus, fistula, xerophthalmia, psorophthalmia, sclerophthalmia, proptosis, atrophia. IN MEMBRANIS HI CONSISTVNT: ruptura, exæsis, distensio, 10 anastomosis, crassities, densitas, corrugatio, extensio, raritas. INTERIORES PALPEBRARVM PARTEIS infestât, aspretudo, crassities, fycosis, tuber, durities, chalazosis, pladarotes, putredo, sarcosis, poriasis. EXTERIORES: guttæ, calculus, phthiriasis, meliceris, gāgrena, phymata, colobomata. IN SUPERIORE PARTE: chritæ, posthia, trichiasis, dystichia, tristichia, palangosis, pyrosis, ptilosis, psoriasis, madarotes, paralysis. 20 COMMVNES TOTI PALPEBRAE: paralysis, proptosis, ectropion. ANGLVLIS HI ACCIDVNT: encāthis, ancylæ, pterygion, rhæas, prosopysis. EXTRINSECVS: egilops, āchilops. ALBVM AFFLIGVNT: 25 psydration, hulus, hypospagma, abscessus, chemosis, cæloma, pterygion, phacosis, icterus, porus, CIRCVLVM OCVLII infestât,



argemō, nephelion, achlys, epicauma, hulus,  
 botrion, phlyctis, mycephalon, staphylema,  
 hypopiō, ruptura, cicatrix, leucoma, cæloma,  
 proptoma, vnguis, pyosis, exulceratio. I N  
 5 PVPILLA ESSE SOLENT: suffusio, glau-  
 cosis, mydriasis, amaurosis, rhytidosis, nycti-  
 lops, hemeralops, myopyasis, diapyasis. MEA-  
 TVS EXERCENT: aporexis, parempto-  
 sis, symptosis, anthracosis. TARA XIS IGI-  
 10 TVR est, cum oculus in exteriorem partem  
 conuertitur, tandemq; rubicundus mediocri-  
 ter euadit. LIPPITVDO, cum album ru-  
 bescit, & palpebræ attolluntur, cū dolore con-  
 niuent, ægréque manus admotas ferunt. I N-  
 15 FLAMMATIONE rubescunt vehementer  
 oculi: palpebræ eleuantur, vt nisi magno ne-  
 gocio queas suspicere. EPIPHORA tum in-  
 flammationis magnæ vniuerso illatæ corpo-  
 ri: tum insignium fluorum cōmune nomen  
 20 est. Propriè vero de oculis refertur: vbi cū ma-  
 xima inflāmatione, etiam humoris copia in-  
 fluxerit. OEDEMA nominant, cum eleuatus  
 apparet oculus, & colorem amisit, vel etiam  
 ægrè mouetur. Interim album quoq; nigrum  
 25 excedit. INFLATIO dicitur, cum subito tu-  
 mescens oculus decolor fit, exuperante pitui-  
 ta: vt plerunq; senibus, æstate potissimum so-  
 let accidere. SCIRRHOSIS ex inflāmatio-



nis diuturnæ vehementia oritur, carne incre-  
 scēte, & subliuida. PROFLVIT oculus cum  
 non solum rubet, sed multas lachrymas ex-  
 cernit. XEROPHTALMIA, id est arida  
 lippitudo, cū anguli hulcera & aspretudinem, s  
 pruritūmq; contraxerunt: palpebrę rubent, &  
 lachryma falsa & acris profluit. SCLERO-  
 PHTALMIA, quasi dicas duram lippitudi-  
 nem, est cū palpebrę duriores sunt, oculi ru-  
 bent, & cū dolore quodam grauescunt. PRO- 10  
 PTOSIS appellatur, vbi ab inflammatione  
 moti sede sua prociđūt. ATROPHIAM no-  
 minant, cum ex longa imbecillitate, vel alia  
 quadam latente causā paululū quasi propul-  
 sus, deinde cauus ad radicem, cum dolore mi 15  
 nor euadit, obscuręque aut nihil omnino vi-  
 det. SCABRAE dicuntur palpebrę, cum e-  
 uersę sanguinolentiores apparent: adhęc ma-  
 gis asperę carnosęque, & fici acinis similes.  
 CRASSAE vocantur, vbi euersę duriores ijs 20  
 quę naturaliter se habent, existunt, & scabris  
 magis carnosę. SYCOSIS, id est ficus, accidit  
 cum in palpebrarū parte interiore carni quid  
 simile enatum fuerit: quod emineat, oculus  
 totus grauescat. TYLOSIS nuncupatur, cum 25  
 in palpebris aspretudines ex senectute crassi-  
 ores, albidę & parum sensiles extiterint: eoque  
 minus demoliri licet. SCLERIASIS est tu-



# INTROD. SEV MEDICVS. 38

mor palpebræ cum rubore dolorēq; difficul-  
ter remedijs cedit. Durat magis quàm inflā-  
matio. CHALA & I A rotunda in palpebris  
tubercula sunt, & mobilia: simulq; digito huc  
5 vel illuc impelluntur. Nomen à similitudine  
grandinis acceperūt. PLADAROTES, cum  
palpebræ mollescunt nimis. PVTREDO cō-  
munis est omnium partium. Palpebræ ex ea-  
dem laborant, vbi tumentiores fiunt, & assi-  
10 duè diffluunt, adipem paulo copiosorem for-  
titæ. CRITHE quæ & POSTHIA dicitur,  
tuberculum est paruulū in eisdem palpebris  
supra pilorum locū. Figura hordeo simile, vn-  
de appellatum est. Generantur alia quoq; tu-  
15 bercula in medijs palpebris eodem appellata  
nomine. LITHIASIS albida quædā & cras-  
sa, callis, lapillisq; similia, quæ oculum pre-  
munt, in palpebris retorsis ostēdit. PHTHI-  
RIASIM vocamus, cum palpebrarum pilos  
20 exigui pediculi infestant. DITRICHIASI  
laborat oculus, cum pilis naturalibus alij sub-  
nascentes ipsum premunt, fluoremq; conci-  
tant. PTILOSIS est cum alij quidem sub-  
nascuntur, naturales autem collapsi, fractiq;  
25 stimulant ac pungunt. PHALANGOSIS,  
cum pilorum subnascentiū duplex, triplexve  
acies, vel in superiore, vel in inferiore palpe-  
bra prouenit. RESOLVTVS oculus dicitur,



# C. GAL. PERG.

vbi naturali motu destitutus, neque sursum,  
 neque deorsum intendi possit: verum sentien-  
 di expers consistat. Frequenter hoc mali par-  
 tibus oculi accidit. ECTROPION palpe-  
 brarum vitium est, cū exulceratis oculis plus  
 extra feruntur. ENCANTHIS, vbi ex vlce-  
 re caro in angulis iuxta nares supercreuerit,  
 quæ palpebras parum diduci patitur. Nautæ  
 hoc vitij peculiare habent. VNGVIS vero est  
 in albo oculi præter modum exulcerato, car-  
 neq; oppleto, membranula nervosa, quæ ori-  
 ens ab angulo, ad pupillam & verticem eius  
 peruenit. RHOEAS, cū anguli foramen ex-  
 latēte quadam caussa, aut praua curatione pa-  
 tescit, vt lachrymas continere non possit, sed  
 postea semper humorem dimittat. COHE-  
 RESCVNT frequenter palpebræ cum albo  
 oculi, vel nigro scilicet, cum in utroq; fuit hul-  
 cus negligēter curatū. Et si nigro cohæreant,  
 visus omnino prohibetur. Sin albo, minus.  
 Græci hoc malum ἀγκυλωσις appellant. AE-  
 GILOPS, vel ANCHILOPS, abscessus qui-  
 dam est in angulo, qui naribus propior est,  
 pus continens: aut ex æso osse, pituita assidue,  
 vel ad angulum, vel vsque ad nares destillat.  
 SPYDRACION de toto corpore, interim  
 de oculi albo dicitur. Est autem velut pustula  
 in summo rubicundum. HVL CVS oritur



in albo vel nigro, cū summa cuticula, quam  
 Græci ἐμδὲρμιρ nominant, diuisa lunæ for-  
 mam vel rotundam, cauam, similis coloris,  
 vel subalbidi acceperit. **HYP O S P H A G M A**  
 5 vocant, cum vasis ab interiore tunica ruptis  
 ab ictu, sanguis intra albi excessum, & interi-  
 orem tunicam coierit. Atq; oculi color sta-  
 tim cruentus, post liuidus existat. **C H E M O**  
**S I S** ex inflāmate vehementi vtrascq; pal-  
 10 pebras in exteriorē partem detorquet, ne to-  
 tum oculum contegant. Propriè vero chemo-  
 sis, cum album vtraque iridis parte inflāma-  
 tione afficiatur: iuxta irim cauum hiatarū  
 similitudine appareat. **C A E L O M A T A** sunt  
 15 rotunda & caua hulcera, racemis latiora, quæ  
 in oculis circa irim nascantur. **A R G E M O N**  
 in iridis circulo, vel in albo, interdum etiam  
 nigro, hulus rotundum & subalbidum ori-  
 tur. **N E P H E L I O N** summæ cutis hulus  
 20 paulo maius argemo, albidum. **A C H L Y S** est  
 circa totum nigrum extremi hulceris cicatri-  
 cula tenuissima, aeri caliginoso assimilis. **E P I**  
**C A V M A**, cum extrinsecus epidermis adusta  
 hulus contraxerit, vel etiam paulo altior q̃  
 25 epiphora magna fiat. **B R O T H Y O N** est hul-  
 cus cauum, purum, angustum, centris rotun-  
 dis simile: hulusculo altius. **P H L Y C T A E**  
**N A M** vocāt, vbi per exulcerationē, vel etiam



fine hac exterior ceratoidis tunicae membra-  
 na tenuissima & sublimis elata, intra se hu-  
 morem collegerit: aut sub tunica crassior hu-  
 mor currens phlyctenam pariat. MYOCER-  
 PHALON morbus est, cum tunica priore  
 iuxta irim, exulcerationis vitio exarsa, secun-  
 da inclinat: vt ceu musculi caput referre vi-  
 deatur. STAPHYLOMA TE oculi pupilla  
 cum inflammatione & dolore attollitur: Et al-  
 bum colore acino vuae simile redditur. HY- 10  
 POPION vniuersam irim pure occupat, vel  
 eius dimidium. REXIS est exulceratio ab  
 ictu, vel alia quadam causa, in alto integras  
 subinde membranas diuidens, vt etiam hu-  
 mores, quibus videndi facultas administratur, 15  
 effundat. CICATRIX appellatur, vbi in ni-  
 gro oculi ex alto hulcere membranae crassities  
 emergit: & color magis albescit. Accedit quo-  
 que albi membranae, sed non perspicitur. LEV-  
 COMA nihil a cicatrice differt, nisi quod ex 20  
 hulcere maior cicatrix simul & crassior i iri-  
 de nascatur, quam leucoma nominant. CLA-  
 VVS cum leuitate & albedine, velut carnosae  
 cicatrix, durum nigri tuberculum est. Frequen-  
 ter etiam albo nigro cohaerenti euenit. SVF- 25  
 FUSIONEM quidam interpretantur, cum  
 humor quidam in pupillam destillauerit, ha-  
 reatque saepe pertinaciter adeo, vt visum offen-



# INTROD. SEV MEDICVS. 40

dat, vel in occurrētibus hebetet. GLAUCOMA  
 SIS est humoris, quem Græci *νεφθαλμοειδὲς* vo-  
 cant, in album atque aqueum colorem mu-  
 tatio, cuius gratia visus impeditur. IN MY-  
 5 DRIAS I pupilla quidē nihil colore variat,  
 dilatatur autē magis, vt iridis circulo sit pro-  
 ximus, & visioni noceat. PHTHISIS appel-  
 latur, dum pupilla arctē coit, vt stimulo assi-  
 milis fiat, tum hebetior, tum rugosior, vt ex  
 10 imbecillitate periculosa, aut ex capitis dolo-  
 re vehementi. SYNCHYSIS, dum humores  
 oculorum non in loco consistunt, proprium  
 ordinem seruantes, sed huc illucq; feruntur.  
 HEBITVDO summa visionis sine causā  
 15 euidenti offensio. NYCTILOPES vocan-  
 tur, qui die vident obtusius, sole occiduo acri-  
 us: Nocte magis adhuc: vel contrā. Die pa-  
 rum. Vesperi aut nocte prorsus nihil. MYO-  
 PES vicina vident: remota non item. DIA-  
 20 PIESIS humor exiguus in pupilla, qui diffi-  
 culter euaporat ac discutitur, suffusione sicci-  
 or. APORRHEXIS est, quando meatus à  
 cerebro & meninge in oculū descendens, ex  
 ictu capitis, vel casu ex alto disruptus, cæcita-  
 25 tem affert. PAREMPTOSIS, vbi meatum  
 qui à basi cerebri veniens, oculo videndi fa-  
 cultatem tribuit, humor adaperto, vel rupto  
 vase incidit, obturatque eum. Vnde cum do-



lore visus offenditur. SYMPTOMASIS accidit cū meatus ex tabe, vel imbecillitate fit arctior, conciditq̃. Quod vitium vt rarū est, sic remedijs ægre cedit. CARBUNCVLVS crustosum est hulus, depascens cum fluore, & inflatione: interim in toto corpore, interim in oculis febribus orientibus.

## DE EXTERIORIBVS CAPI-

TIS AFFECTIBVS.

**E**Xtrinsecus accidunt hi, qui inter longos ascripti non sunt.

## DE CALVARIÆ FRACTVRIS.



Aluariae fracturarum differentia quinque existunt: rhogme, engisma, ecpiesma, apochema, & camarosis. Distentio futurarum hydrocephalon, furfures, ptyriasis, meliceris, atheroma, fauus. Porro eam partem quæ capillo tegitur, & mentum occupant, alopecia, ophiiasis, caluities, phalacroasis. Pili omnes fluunt, exterminantur, quassantur, scinduntur, in puluerem rediguntur, subflauescunt, canescunt. Oculorum morbi separatim conscripti sunt. Aurium contusio, pterygomata, fractura cartilaginis, sordium vel exuperantia, vel defectus, grauis auditus, surditas, puris fluor, cursus graueolens. Nares excruciant ozæna, polypus, hulus, fractura, peruersio, compressio, simo-



INTROD. SEV MEDICVS. 41

sis. Os infestat gingiuarum putredo, dentium  
erosio, eorumq; dolor: & cū è sede sua labant,  
abscessus, epiglottis, epulis, parulis, aphthæ,  
crustæ, paristhmia, vua, ficus. Faciem occupāt  
5 ephelis, vari, lentigo, ossium fractura. Disten-  
sio cōmissurarum, eluxationes maxillæ à ge-  
na. Ceruicē habent synanche, cynanche, stran-  
gulatio, vertebræ excidentēs, strumæ, steato-  
mata. Scapulas malè habet, verticis ipsarū fra-  
10 ctura, distētio. Iuncturā cubiti occupant me-  
liceris, atheroma, steatoma, humor aqueus.  
Primæ palmæ partem ganglia. Digitos ma-  
nus & pedis chymethla, rediuiū. Quamcū-  
que corporis partem inflāmatio, tumor, infla-  
15 tio, duricies, abscessus, huncus purum, huncus  
fordidum, cauum, supercrescens, crustosum,  
ficcum, fluēs, subpascēs, callosum, fistulosum,  
putredo, phyma, dothien, therminthes, phy-  
gethlon, chalaza, pagedena. Phlyctides, carbū  
20 culi, epinyctides, eresypelas, herpes. Mamil-  
las, tum naturalia sexus vtriusque vexant car-  
cinomata. Quamlibet corporis partem im-  
petunt carcinoma occultum, carcinoma vl-  
ceratum, therioma. Inguina, bubones simpli-  
25 ces, phymata purulēta inuadūt. Genu, gony-  
algia, rheumatismi, calli. Poplites steatoma-  
ta, anchylæ. Tibiam, varices. Suram durities,  
chironia hulcera. Sūmam pedis partem, ni-

g.j.



gredines, necrosis, podagra, fistula. Calcem, lepis.

## DE CVTIS AFFECTIBVS.



Vtē, totiūscq; corporis partes ex-  
agitant lepra, pſora, alphas albus, 5  
alphos niger, leuce, impetigo sim-  
plex, impetigo agrestis, dracorti-  
asis, acrochordones, thymi, myr-  
mecia, clauus, calli. Quidam horum ex poda-  
gra, & articulari morbo quādam ex sese oriū- 10  
tur. Sedem afficiunt hæmorrhoides cecæ, ri-  
mæ, proptosis, cōdylomata, pylides. Aduenit  
etiam vuluæ proptosis, cum in exteriora pro-  
cidit. Scrotum habēt, enterocoele, cirsocele, epi-  
plocele, sarcocele, porocoele, steatocoele. Totius 15  
corporis ossa patiuntur cariem, spacelum, fra-  
cturam sine vulnere, vel cum vulnere, ecbyr-  
foses. Fracturarum differētię quinq; sunt. Pri-  
ma schidacedon facta, id est, vt latini homines  
intelligāt, per rectitudinem. Altera per trans- 20  
uersum καυληδὼν Græci dicunt. Tertia rapha-  
ni in morem ῥαφανιδὼν. Quarta caryedon, po-  
stremo alphitoedon facta. Nigrescūt interim  
ossa in fracturis, interdum sine his. Articulis  
accidunt, paragogæ, è sede propria motio, elu- 25  
xatio, luxatio, colligatio, porosis, rheumatif-  
mi, distensio commissurarum.



INTROD. SEV MEDICVS. 42  
DE CHIRVRGICA.



**C**hirurgia est alieni, vt propriè vo-  
cant, per incisiones, compositio-  
nēsq; cum via quadam & ratione  
ablatio: adhæc vulnerum atq; hul-  
cerum humano corpori acciden-  
tiū curatio. Primariæ eius actiones duæ sunt:  
compositio, & diuisio. Harū rursus variæ sunt  
species. Compositionis quidē, fractorum os-  
sium coniunctio, & deligatura. Luxatorum  
repositio, intestinorum, quæ prociderunt col-  
locatio: adhæc vuluæ, & recti intestini. Curto-  
rum applicatio, siue adductio, vt in naribus, la-  
bris, atq; auribus. Diuisionis species: simplex  
incisio, præcisio, hypospatismus, periscythif-  
mus, angeologia, excisio, adustio, rasio, lima-  
tio. Simplici sectione in abscessibus vniuersis  
vtimur. Diuidendum vero membrum est re-  
cta linea, non trāsuersa. Præcisioni locus est in  
alis, inguinibus, natib⁹, & anu. Hypospatismo  
in facie, cum oculi fluūt. Periscythismo in sin-  
cipite, & colis pellicula, quam præputium vo-  
cant, nigricante. Excisioni in membris nigre-  
scentibus, & capitis fracturis. In ossibus om-  
nibus, alijsq; multis vstio, rasio, limatio vtilis  
sunt. Vstio candentia ferramēta requirit: pro-  
priè in ijs malis quæ depascūt, & oculis rheu-  
maticis, coxis, vel etiam interioribus. Etenim

g. ij.



in tabidis candentia ferramenta assumuntur,  
 & in lienosis: tum i humeris, qui in alam ex=  
 cidere consueuerunt. Insuper in ægilope, in ni=  
 gricantibus, vel ijs quæ propter adaperta va=  
 sa aduruntur. Postremo in alijs sanguinis pro=  
 fluxionibus. Hæc itaque in capite consistunt,  
 quæ à manu auxiliantur. Fracturarum gene=  
 ra sunt hæc. Rogme, empisoma, ecpiasma, a=  
 pochema, & camarosis. Nonnullorum sen=  
 tentia additur trichiasis, summa ossium in=  
 sculptio. HYDROCEPHALON quatuor  
 species obtinet. vnam cum intra cerebrum &  
 inuolucrum eius humor subsidet. Alteram,  
 cum intra membranas & ossa: Tertiam, cum  
 intra os, & pericranium: Reliquam, vbi os &  
 cutem interiacet. Circa cutem oriuntur me=  
 liceris, atheroma, & extrinsecus incidens alo=  
 petiasis. Itaq; alopetias laniamus, meliceridas  
 & atheromata obliquè, vel simpliciter sum=  
 ma cute diuisa, deinde tunicis per digitos a=  
 uulsis, cum ipsis humoribus, qui insunt aufe=  
 rimus. Hydrocephalon sub cute & pericranio  
 duabus, vel tribus rectis lineis incisis euacua=  
 mus. Quod sub ossibus est, excidimus. Quod  
 tandem intra meningem cerebrũ incidit, in=  
 sanabile est. Onus fracturarum caluariæ spe=  
 cies excisione administratur, quæ id quod in  
 ossibus fractum est, aufert. Veteres igitur mo



diolis teretibus secantes ipsa excidebant. Pos-  
 teri terebris vsi sunt, ægros in sedile, tum se-  
 ipsos collocantes. Hac tempestate ægris tan-  
 tum sedem exhibēt. Ex oculorum vitijs, hæc  
 5 manus præsidium expetunt, trichiasis, hyati-  
 des, encanthides, vngues, staphylomata, suf-  
 fusiones, fluores diuturni, & excedentes, pal-  
 pebrarum calculi, conglutinatio: in angulis o-  
 culorum ægilops. Palpebras itaque prociden-  
 10 tes sursum attrahimus: id quod præter natu-  
 ralem habitum est auferentes. Vbi alius pilo-  
 rum ordo subcreuit, acus candens ab angulo  
 sub ipsis radicibus, immittitur. Hydatidas sin-  
 gulatim tollimus. Encanthidas, vngues, & sta-  
 15 phylomata præcidimus. Quæ solum ad ipsas  
 radices per medium transuere acu lina ducen-  
 te oportet. Vngues vel encanthidas, vel lino,  
 vel hamulo attrahimus. Hypochyma pun-  
 ctione tollimus, iuxta minorē angulum, ver-  
 20 sus pupillam adhibita. Deinde in eius sum-  
 mo concretum pupillæ humorem fractioni-  
 bus radentibus: stringentēsque, ne suspitias.  
 Hypospatismus, periscythismus, & angiolo-  
 gia fluorem sistunt. Hypospatismus itaq; tri-  
 25 bus fit supra frontem diuisionibus. Post fer-  
 ramento quod spathomolā appellant per cor-  
 pora quæ interiacent, transmissio. Periscythis-  
 mus est, cum transuersis lineis coronæ modo  
 g. iij.



frons secatur. Altera ipsius parte paulo superius quam tempora sunt, quædam triangula amputantur, Græcorum literę Δ similia. Angiologia perficitur vasis latentibus à tempore ad tempus in profundum diuisis. Palpebrarum calculis medemur magna ipsarum diuisione: qua lapides integrè auferimus. Connatas palpebras scalpello aperientes siccis medicamentis diducimus. Aegilopas ad os vsque excidentes ferramentis candētibz adurimus. 10 Sunt autem qui loco ferramentorū candentiū terebra os forant, vt in naribus. Polypum, qui in naribus nascitur, acuto ferramento ab osse resolvimus: & rasorio postea radices demetimus. Ozænæ raro ad sanitatē proficiunt: 15 curatio vero earū in iisdē versatur. In ore epulidas, & parulidas diuidimus, vbi suppuratio se ostenderit. Vuas discedentes, siue collapsas nimium incidimus, vossella præhendētes. Dentēs eximimus remouendo. Durities exceden- 20 tes naturam in tonsillis aduersis plagis amputamus. IN CERVICE steatomata, & strumas, summa cute diuisa, & digitis auulsa, tum vasorum complexu dissoluto tollemus. Ganglia quæ in metacarpis vt plurimum eueniunt, 25 & mulieribus lana victum quæritantibus interim extundimus: interim ceratis mollita curamus. IN ALIIS tubercula, & strumas præ-



cidimus. Similiter in inguinibus. Abscessus inter costas diuidētes non vniuersim, sed moderatē, paulatimque puris excretionem molimur: sunt qui exurant eos. C A R C I N O-

- 5 M A T A in multis corporis partibus, maxime foeminarum mammis oriūtur. Præcidimus vbicunq; fuerint, & ferramentis peruruntur non admodum candentibus, siue ignitis. Non desunt qui alijs ferramētis ignitis simul  
 10 secantibus & adurentibus vtuntur. Exomphali omnes quibus vmbilicus extuberat, appellantur. Differentia triplici comprehendūtur. Quidam enim pneumatomphali, quasi qui spiritum sub vmbilico collegerint. Alteri en-  
 15 teromphali, quibus intestina ad vmbilicum procedūt. Reliqui hydromphali, qui aquam sub vmbilico gestant. Omnes differentia manu sanantur, lino duplici per acum immisso, & vmbilico cōstricto. Hydropicos paululum  
 20 supra vmbilicum pungimus ferro, quod myrfinen vocant. Apellarum duplex curatio. Horum qui intrinsecus: illorū qui extrinsecus orbiculatim in summa cute diuidūtur, vt glans intus attrahatur. Qui dicuntur atreti, siue fo-  
 25 ramen habeant tenue, aut nullum omnino, auxilium capiunt hoc pacto: Acuto specillo immisso, id adaperitur: deinde digito submittentēs vndique dissoluimus. Lapides in vesi-

g. iij.



ca habentes secamus, calculum vesicæ collo-  
 stringentes, excisorio cultro diuidemus sub-  
 ito adiectam materiam, & ferro ad id idoneo  
 calculum auferemus. Quibus vrina propter  
 copiam non redditur, vesica distenta vt remit-  
 tere se nequeat, per fistulam vrinam elicimus.  
 Immittitur autem in anum per meatum ad  
 vesicam vsq̃. Tumorū qui scroto accidunt,  
 septem species sunt: hydrocele, porocele, stea-  
 tocele, sarcoccele, epiplocele, cirsocele, entero- 10  
 cele. A quibusdam hæc adduntur, hyderente-  
 rocele, sarcoepiplocele. In his qui hydrocele  
 laborāt, scrotum diducendum est, & vbi ma-  
 ximè venosum est, humorem tunica compre-  
 hensum euacuare oportet, & tunicæ superua- 15  
 canea auferre. In quibus sine tunica est, excer-  
 nere humorem sufficit. Steatocelas, & poro-  
 celas similiter excedentes sinistra manu seca-  
 re conuenit, scrotum postea in superficie di-  
 ducere, donec adipi, vel callo, vel alij cuiun- 20  
 que incidamus, & hoc auferemus. Pari mo-  
 do sarcocelici tractantur. Oportet autem car-  
 nem albicantem præcidere: rubram emollire,  
 & in atrum colorem mutare. Adhæc reliqui-  
 as adimere expedit. In cyrsocelis extendes va- 25  
 ricem hamulo: in superficie diuisum auelles,  
 relicta ceu digiti parui latitudine. Reliquum  
 extensum absca. Cura vero nō mediocris ad-



hibenda est in nervis illis complicatis, κρεμα-  
 σήγας Græci vocant, & testiculis. Enteroceli-  
 cos, & epiplocelicos ita secamus, reprimentes  
 intestinum, vel omentum diligenter, mox se-  
 5 minariū meatum: auferemus quā fieri po-  
 terit commode. Sin minus, peritonæum attra-  
 hentes, & fune acceptū præcidimus. Hæmor-  
 rhoidas lino duplici per sedem ipsam eleuan-  
 tes, complectentēsq̃ue post horas duas absci-  
 10 dimus. Fistularum nonnullæ perforatæ non  
 sunt, os tantum habentes. Quædam perfora-  
 tæ vel intus in anum, vel extrinsecus. In per-  
 foratis in anum specillum immittes: mox di-  
 gitum in sedem adferēs, intestinum attrahes  
 15 mucrone specilli, idēq̃ amputabis, ab inferiore  
 loco incipiens, perforatas extrinsecus specilli  
 acumine penetrare vtile est omni sano corpo-  
 ri. Sunt autē qui varices in cruribus primum  
 extrinsecus incisionibus insigniunt: post hæc  
 20 summam cutem diducūt: deinde hamulo va-  
 ricem attrahentes, deligant, atque tunc absci-  
 dunt. Dracontia varicibus similia sunt: ma-  
 gnum vero dolorem dum paululum promi-  
 nentes mouentur, concitant. Oportet autem  
 25 deligatis, vt varicibus, summam cutem detra-  
 here, sicq̃ præcidere. Clauos cultello, acrochor-  
 donas, thymas, myrmecias excedentes adu-  
 rimus, vel pforico illinimus. Curta in narib⁹,



auribus, oculis, hoc modo ad naturalem habitum restituuntur: labra scalpello vndiq; deradentes cruentamus: deinde adducentes densius fuimus. Labra vtrunque vbi connata sunt inuicem intus & extrinsecus diuidimus, distendimusque, nec caro inde relaxatur. Quæ auribus, vel naribus curta accidunt, cum fuerit cartilago diuisa, producere aliam conuenit: vel sic consuere lanæ filo.

## DE OSSIBVS CONFRACTIS. 10

**F**racta membra ex distensione quidem in rectum restituuntur. Ex deligatura callo obducuntur. Caluaria ergo fractiones quot modis accidunt, quomodoque curentur, diximus. Et si 15 in facie fractura contingat vt in capite, sanare conuenit, osse, quod affectum est, adusto. Sciendum autem est, quæ ossa fracta curationem non recipiant. Si igitur nares confractæ sunt, non recte possunt restitui. Aurem etiam 20 frangi scribit Hippocrates, quoniam eius cartilago imitatur os: ægerrimeque in pristinam figuram reducitur. Verum si ex palato fracturam accipiant, resimæ euadunt, & insanabiles. Porro si clauicula, vel iugulum, vel alia 25 quædam costa, & hæc frequenter refarciri non possunt. Epithemata in iugulo adhibenda sunt, ipsumq; ab ala, ad alam deligandum est. Ca-



terum si quod maiorum membrorū fractum  
 sit, vel minorum partium, vt digitorum no-  
 di, vel ossa volæ, vel oppositæ eius partis, vel  
 tarfi, omnia quidem in magnis caulædon, vel  
 5 raphanedon, & schidacidon franguntur. In te-  
 nuibus caryedon, vel alphitidon. Omnia er-  
 go fracta deligantes, extendentesque admo-  
 dum vehementer & valide diducere, & mul-  
 tum inuicem separare oportet vt restauren-  
 10 tur, pristinamque figuram recipiant. Non au-  
 tem in rectum omnia restitui debent, sed ad  
 proximi cui cohæret, membri figuram. At si  
 os rectum sit, rectè: si obliquum, vel alio quo-  
 uis modo curuum, aliter. Modus autem de-  
 15 ligaturæ præparandæ hic est, ad omnē fasciam  
 ex lintheis veteribus, tum latitudine, tum ma-  
 gnitudine mēbro respōdens. Latitudine qui-  
 dem in maximis digitorū quatuor, vel quin-  
 que. In tenuioribus non minus digitorū triū.  
 20 Deligaturæ hæc ratio. Prima fascia ter nobis  
 sursum versus feratur vt plurimum. Altera di-  
 midio longior in eodem loco incipit, euariās  
 deorsum quidē, ad superiora vero reducitur.  
 Illinenda hydrælæo, vel ænelæo, vel glycelæo  
 25 aduscq; triduum expedit. Post cerato laxo, vt  
 oleum crassum videatur. Verum iunctura ita  
 paretur ne nimium astringat, vt alienetur, sed  
 mediocris sit vt membrum conquiescat: nec



laxa, vt contineatur, & repellat influxus, inflā-  
 mationis. Pōst splenia triplici, quadrupliciꝑ  
 figura adhibeantur, quæ membrorum crassi-  
 tiem impleant. hæc quoque ipsa stabiliant, ne  
 sibi mutuo incidant, nec dissidentia interual- 5  
 lum relinquunt. In his fascia cōuenit triplex,  
 quæ à fractura deorsum veniens, sursum rur-  
 sus feratur, ibiꝑ finiat. Soluere membrū ter-  
 tio die, interim septimo si necessitas exigat,  
 debetis. Inde licebit ferulas circumponere, in 10  
 teruallo distantes, quæ ossa in sede sua conti-  
 neant, & in quam partem fractura inclināt, ab  
 ea latior, valentiórque ferula adiungenda est.  
 Maximè hic modus deligaturæ cōfert ijs, quæ  
 alphitedon fracta sunt, cū vulneribus & mul- 15  
 ta contusione musculorum: in quibus etiam  
 linamenta madentia imponenda sunt. Lina-  
 mentorum sunt quinque species: aliud flexi-  
 le, aliud rasile, aliud succidum, alia quæ Græ-  
 ci ἐμυχνιωτὸν & παπσωτὸν appellant. Luxa 20  
 ti distenduntur: repositio membri distensio-  
 nem propriè sequitur. Omnia in Hippocrati-  
 co subsellio restituuntur, simul & tensa, & com-  
 missa. Caput luxatur, nam articuli circuitum  
 obtinet. Maxilla in priorem partem propelli- 25  
 tur, sed modo altera parte modo vtraque. At  
 solis manibus in sedem suā compellitur hinc  
 illincꝑ ad malas adducta. Humerus cum in



alam tantum excidit, lignea spatula cum in-  
 tēſione in ſedem reducitur, ſunt & alia inſtru-  
 menta, quæ palæſtrica nominant. Cubitus in  
 omnes quatuor partes excidere poteſt. Si in  
 5 exteriorē, interiorēve diſtentione reponi-  
 mus. Si in priorē, vel poſteriorē ſine di-  
 ſtentione reſtituimus. Manus, & eius oppoſi-  
 ta pars, adhæc digiti, modicè diſtenti repo-  
 nuntur. Quævis ſpinæ peruerſio, tumor, & ſi-  
 10 nus reſtaurari non poſſunt. Femur in omnes  
 quatuor partes promouetur ſepiſſime in inte-  
 riorē, deinde in exteriorē, raro admodum  
 in priorē, aut in poſteriorē. Genu quo-  
 que in exteriorē partē, interiorē, & po-  
 15 ſteriorē excidere notiſſimum eſt, in prio-  
 rē nequaquam, cum idem oppoſita patel-  
 la, ipſa quoque caput tibiæ contineat. Talus  
 modicè prolapſus ægre reſtituitur. Si magna  
 ſit luxatio, ægerrime. Periculosa enim nimis,  
 20 & niſi cum vulnere accidit. In digitis nihil vl-  
 tra fieri debet quàm quod in his, qui ſunt in  
 manu poſitum eſt. Commiſſurarum interual-  
 la, vt in facie, cubiti & radij, tibiæ & furæ, me-  
 tacarpij & volæ, tarſi & plantæ in veterem fi-  
 25 guram reſtituuntur. Porro quæ membra ni-  
 greſcunt, vel depaſcuntur, ſiue ex fracturis, ſi-  
 ue violēta aſtriſtione tota ſæpe adurimus. Si-  
 militer in ijs facimus, quos venenatæ feræ mo



270 C. GAL. PER G. AT MI  
morderunt, mox ferramentis probè candentibus  
passionem sistimus. Deinde ubi crustæ  
expurgatę fuerint, tanquam vlcera curamus.  
Venenatorum morsus neque cito ad cicatricem  
ducimus, sed frequentius hulcerum modo  
fluorem ex eis concitamus. 25

Τέλος.

C. GALENI PERGAMENI  
INTRODVCTIONIS SEV ME

DICI GVINTERIO IOANNE


ANDERNACO IN

TERPRE

TE:


FINIS.







CLAVDII GALI  
 PERORATIONE  
 MEDICINAE



possit, iam vero quod...  
 dicuntur & periculis nonnullis...  
 to tamen consuevit, sed...  
 igitur & ipsam medicinam...  
 forisq; hanc esse...  
 salubris quidem vocat, tunc...  
 sanitatem inueniunt, cum ad...  
 & tamen rationibus...  
 sunt. A multis enim...  
 illis cupidis, medicos esse...  
 to hunc scientiam delectant...  
 inter omnes conuenit, sed...  
 iam vltimo & experientiam...  
 transiit tunc non parum...  
 Ceterum nonnulli & professione...  
 natur. Tunc perit & sola experientia. Rationes

CLAVDII  
 PERGA  
 MEDICINAE



possit. In  
 dicament  
 to sentem  
 igitur &  
 forumq;  
 Salubria  
 fanitate  
 15 randa  
 sunt. A  
 illis cup  
 ro hor  
 inter o  
 20 lum v  
 tante  
 Ceter  
 natur



CLAVDII GALENI  
PERGAMENI DE SECTIS AD  
MEDICINAM INTRODUCTIO.



Edicæ artis scopus, sanitas est: finis, ipsius possessio. Porro medici necessario interest cognoscere, quibus aut absentem sanitatem restituere, aut præsentem tueri possit. Iam vero quæ absentem restituunt: medicamenta & præsidia nominantur: quæ præsentem conseruât, salubris victus ratio. Hæc igitur, & ipsam medicinam salubriû, morborumq; scientiâ esse, veterû scripta declarant. Salubria quidem vocant, tum ad præsentem sanitatem tuendam, tum ad amissam recuperandam accommoda. Morbosa his contraria sunt. Amborum enim cognitio his vitandis, illis cupiendis, medico est necessaria. Vnde vero horû scientiam definierint, nondum satis inter omnes conuenit. Sed alij quidem solum vsum & experimenta satis esse pronuntiant: alijs ratio non parum videtur peragere. Cæterum nonnulli à professione sua nominantur. Empirici à sola experiëntia. Rationales

h.j.



similiter à ratione. Atque hæ duæ principes  
 medicorū sectæ sunt. vna quidem vsu & ex-  
 perimentis medendi rationem inquirit: altera  
 per indicationem. vtrique nomen inditū est:  
 priori Empirica: secūde, Rationalis. Cæterum 5  
 hanc dogmaticam, & *μνημονευτικήν* græce, à man-  
 dandis memoriæ quæ vsu vsurpata fuerant,  
 appellare prisci consueuerūt. Hinc illarū pro-  
 fessores partim Empirici, obseruatores, & *μνη-* 10  
*μονευτικοί* euidentia memoriæ tradentes: par-  
 tim dogmatici, & ratiocinatores nuncupātur.  
 Porro Empirici hūc in modum ex vsu, atque  
 experimentis artē constitui pronūtiānt: quod  
 multos hominibus affectus viderent oboriri: 15  
 quosdam sua sponte, cōmunes, tū ægris, tum  
 sanis, vt sanguinis fluorem ex naribus: vel su-  
 dores, vel alui profluvia: vel aliud huiusmodi  
 quippiā, quod vel offensam, vel præsidium affe-  
 rat: non tamen causam effectricem, quæ sub 20  
 sensum cadere possit, ostendat: alios, quorum  
 causa euidens satis fuit, non tamen ex nostro  
 instituto, sed casu quopiam euenire, vt colla-  
 psū, ictū, aut aliter vulneratū sanguinē  
 mittere, frigidā bibere in morbo, cupiditati 25  
 obsequentem, aut vinū, aut id genus alia, quæ  
 singulatim vel profunt, vel offendunt. Primā  
 itaque speciem auxiliorum, vel offensarū, Na



turalem vocant: alteram, fortuitam. Priorem  
 vero ytriusque speculationem *ἰσχυρισμὸς* græ-  
 ci nominant: inde adeo quod rebus ex impro-  
 uiso, nec volentibus nobis accidat. Hæc igitur  
 experientiæ species est huiusmodi. At quæ vi-  
 5 tro euenit, ex nostro pendet arbitrio, cum vel  
 somnijs, vel alia ducti opinione quippiã exer-  
 cemus. Tertia species est imitatoria, vbi, quid  
 iuuerit, aut offenderit vel natura, vel casu, vel  
 suomet instinctu, statim in ipsis affectibus vsu  
 10 ac experimento probetur. Atque hæc est, quæ  
 artem ipsorum potissimũ constituerit. Non  
 enim bis dũtaxat, aut ter, verũ sæpius id quod  
 profuit, imitati sunt. Postea in eisdem vitijs  
 idem valere frequẽter cõperientes, eiusq; me-  
 15 moriam speculationem appellantes, fidã mo-  
 dõ, & medicinæ & partẽ arbitrantur. Quam-  
 obrem vbi multa id genus Theoremata colle-  
 gissent, vniuersam congeriem medicinã col-  
 20 lectorem medicũ appellant. Talis autẽ conge-  
 ries, propria cuiusq; inspectio, græce *ἰστορία* *ἱστορία*  
 est: memoria videlicet eorum, quæ subinde si-  
 milique modo oculis comperta sunt. Quam  
 rem experientiam nominare licet: eius profes-  
 25 sionem, historiam. Nam id ipsum obseruati  
 suamet inspectio est: discenti vero iam obser-  
 uatũ, historia. At quia in mali genus aliquod  
 nondum prius visum vel cognitum incidebāt

h.ij.



& in ijs locis, vbi nulla esset remediorum co-  
 pia, quæ vsu explorarint, instrumentum ali-  
 quod auxilijs inueniendis inuenerunt, nempe  
 ad similia trangressionem : qua vtentes cre-  
 bro etiam ab affectu, ad affectū similem idem  
 præsidium transferunt. item à loco ad locum:  
 à remedio prius cognito, ad vicinum aliquod  
 transeunt. Ab affectu quidem ad affectum, vt  
 si ab Erysipelate ad Herpetem trangrediaris.  
 A loco ad locum, vt ab humero ad femur: à  
 præsidio ad præsidium, vt in alui profluuijs à  
 pomo ad mespilum. Atqui omnis huiusmo-  
 di transitus ad inuentionem via est. Verum  
 inuentio nondum ante experimentū est: vbi  
 vero eius quod speratum sit periculum fece-  
 ris, iam certum veluti testimonio experientiae  
 habetur, non minus ac si plerunq; pari modo  
 valere obseruatum fuerit. Porro experientiā  
 hanc similium trāsitus comitem exercitatio-  
 riam vocant: quod eam qui hac ratione quid  
 inuenturus sit, in arte exerceri conueniat. Ac  
 priores vniuersæ probationes experiētiā præ-  
 cedētes, quas ars in sui cōstitutionē requirit,  
 in quibuscumq; fieri possunt. Talis nāq; per vsū  
 ac probationem ad artis finem via est. Cate-  
 rum quæ rationi nititur, corporis naturę cui  
 mederi conatur, iubet perdiscere: adhæc om-  
 nium causarum vires, quibus affectum quo-



tidie corpus aut salubri<sup>9</sup>, aut valetudinarium  
 magis euadit. Insuper aeris, aquarum, loco-  
 rum, studiorum, cibi, potionis, & consuetudi-  
 num rationē medicum percallere conuenit :  
 5 quò morborū omnium morbos, & remedio-  
 rū facultates inueniat. præterea cōijciat, ratio-  
 cineturque medicamentum huiusmodi facul-  
 tate præditum, id genus causæ adhibitum, ta-  
 le quippiam effecturū esse. Quia, prius quàm  
 10 in his omnibus variè se exercuerit, fieri non  
 posse aiunt, vt remediorū facultatē cōsequa-  
 tur. Esse videlicet, vt exiguo paradi-gmate to-  
 tum id condiscas, pars corporis aliqua dolens,  
 & dura, & cōtumax, & tumidiuscula. Hic cau-  
 15 sa medio inuenienda est. primum quòd hu-  
 mor quispiam naturali copiosior in partē de-  
 fluens ipsam attollat, & distendendo afficiat.  
 Deinde si quid influat, cohibendum est. Sin-  
 minus, pars iam euacuāda est. Qua igitur ra-  
 20 tione fluidum adhuc sistes, & quod contine-  
 tur vacuabis? Refrigerando sanē & astringen-  
 do particulam, fluorem sistes. Humectando  
 laxādōq; collectum vacuabis. Hoc itaque pa-  
 cto ab ipsa dispositione, cōueniētis indicatio-  
 25 nē accipiūt. Nō hanc solū esse satis aiunt: ve-  
 rum ab ægrotantis viribus alteram sumi: item  
 ab ætate aliam: nec minus à propria ægri na-  
 tura aliam. Pari modo ab anni tempore, loci,  
 h. iij.



CLAVD. GAL. PER G.

natura, studiorumque & consuetudinis ratio-  
 ne peculiarem a singulis idoneorum indica-  
 tionem fieri. Verbi gratia, ut hoc quoque exe-  
 plo fiat dilucidius, fingam aliquem acriter  
 febricitatem, ad motum segnem, gravitatem  
 corporis sentire: fingamus item tumidum ma-  
 gis & rubicundum esse quam prius: adhuc ve-  
 nas elatiores apparere, quis dubitat sanguinis  
 calidioris copiam huic redundare? Quod igitur  
 remedium: nimirum euacuatio: quae abundan-  
 tia est contraria. Nam contrarii contraria  
 sunt remedia. Quomodo iam euacuabimus,  
 aut quousque, hoc nondum a causa sola constare  
 potest. Nam vires, aetate, tempus, regionem,  
 aliaque paulo ante commemorata prius inspi-  
 cienda sunt. Quippe si validis existat viribus,  
 aetate florenti, & tempus anni vernum, & regio  
 temperata: non peccabis, si vena incisa vacues  
 sanguinem: quantum causa postulet. Imbe-  
 cilli autem viribus, aetate vel puero admodum  
 exiguo, vel seni, in loco frigidior, ut Scytharum  
 plaga, aut calidior ut Aethiopia: & anni  
 tempore, vel insigniter frigido, vel calido:  
 nemo venam incidere ausus fuerit. Similiter  
 consuetudinem, studia, & naturas corporum in-  
 tueri praecipunt. Siquidem ab omnibus istis  
 propriam curationis indicationem assumit.  
 Porro, a quibus Methodici sanationis indica-



tionē capiunt, inde Empirici obseruationem. Prædicta enim symptomatum congeries in febricitate, *συμφορὰν* vocare cōsueuerunt, Dogmatico quidem vacuationē ostendūt: Empirico obseruatorū recordationē. Etenim in huiusmodi affectibus, cū euacuationē sæpe profuisse viderit, nūc quoq; eadem vsus, de successu bene sperat. Quinetiā florentes ætate vacuationē sufficientem nulla planē molestia ferre cōspexit: ex quibus id crebro aduertit. Sic vere magis q̄ æstate, & in loco tēperatiore: tū si cōsuetudo quæpiā vacuādi ægro fuerit, nepe per hæmorrhoidas, vel ex naribus, Dogmaticus quidē hui⁹ rei occasione sanguinis abūdantiā a rei natura incitatus adimit: Empiricus autē, q̄ hunc in modū obseruauerit. Sūmatim eadē remedia in eisdē affectibus & Dogmatici, & Empirici assumūt: de ipsorū inuētiōis modo dissentientes. Qm̄ symptomata eadē in corpore apparētia, causā Dogmaticis indicāt: unde curationē ipsi iueniūt. Memoria vero rerū subinde similiter obseruatorū Empiricis. Vbi nullū euidentē symptoma, quod causā ostēdat, Dogmatici habent: ibi nō verent̄ q̄rere causā, quā p̄catartica nomināt. Vt si canis rabidus momorderit, aut vipera, aut aliud qd̄ eiusmodi. Si qdē hylcus ipsū nihilo magis ab alijs diuersū sp̄ appareret: aut prorsus ab initio. Quippe

h. iij.



in rabido cane perpetuo simile ijs qui ab alio  
 quopiam morfi sunt, apparet. Verum in vipe-  
 ris priori tempore alijs simile: posteriore quā  
 iam deterius habuerint, affectiones quædam  
 pernitiolæ corpori ipsorum exurgunt. Et fe- 5  
 rè huiusmodi symptomata omnia, quæ à be-  
 stijs virus iaculantibus proueniant, deploratæ  
 salutis, à principio statim meliora, postremo  
 pernitiem pollicentur. Quæ igitur proba cu-  
 ratio adhibebitur? An videlicet venenū quod 10  
 simul cum morfu corpori incidit euacuandū  
 est? Non itaque citatrix obducenda, & vulnus  
 tale subito claudendum est: sed ecōtrario mi-  
 nutim omnino incidendum sæpe venit: tunc  
 autē calidis, acribus, & que trahere siccarēq; 15  
 virus possunt, medicamentis ob eandem cau-  
 sam vti conuenit. Eadem adhibent Empiri-  
 ci, non à rei ipsius natura ad ipsorum inuen-  
 tionem ducti, sed vsu compertorum memo-  
 res. Quemadmodum etiam in ætatibus, tē- 20  
 poribus, & locis. Itaq; si iam vtrasq; inuentio-  
 nis vias esse veras inuicem concederent: pluri-  
 bus hic verbis opus non esset. Quoniam verò  
 experientiam Dogmatici damnant: alij tan-  
 quā parum sibi cōstantem: alij vt imperfectā: 25  
 reliqui vt artis expertē. Rationē rursus Empi-  
 rici quasi cōiecturalē p̄babilēmq; nō autē ve-  
 rā reprehendūt. Duplex vtriusq; sermo lōgusq;



nimiū protenditur, dum se mutuo accusant,  
defenduntque. Nempe Asclipiades cōtra ex-  
perimentorum obseruationē agens, nihil eo-  
dem saepe modo videri posse: indēq; ipsam  
5 parum sibi constantē, & nullius vel minimi  
inventioni satis esse demonstrat. Erasistratus  
simplicia in simplicib⁹ per vsum inueniri pos-  
se profitetur: quippe Portulacam dentiū stu-  
pori esse remedio. Non statim composita in  
10 compositis itidem concedit, ratus illam non  
omnino vel aliquibus inueniendis ineptam  
esse, licet vniuersis vna sufficere nequeat. Hæc  
sunt illorum, qui per experientiam talia inue-  
niri consentiunt: sed vituperāt eandem, quod  
15 incerta vagetur ac in nullo sistat præscripto: tū  
quod longa, & amethodos, vt ipsi aiūt, id est  
sine via & ratione consistat. Deinde rationa-  
les professionem suā per omnia sibi constātē,  
firmāque prædicāt: experiētiā contrā ve-  
20 luti rem ab omni arte remotā insectātur. Vi-  
cissim Empirici rationaliū diēteria reuellen-  
tes, experientiam consistentem, artificiosam,  
& quæ satis cuique faciat, ostendere conātur:  
rationē multis adeo modis reprehendere, vt  
25 ad singulas accusatiōis species Methodicis re-  
spondeāt. Nam hi quum naturam corporis,  
morborum omnium generationes, remedio-  
rum vires cognoscere se pronuntiant, Empi-



rici cominus progressi omnia illorū criminā-  
 tur, tāquam probabilia, similiq; vero tantū,  
 nullam autē firmam cognitionem habentia.  
 Est quum ipsorum cognitionem concedunt:  
 ysum vero aliquem, nō similiter. Interim vbi  
 hunc quoq; esse permiserint, rursus superua-  
 caneum affirmāt. De his sanē cōmuniter Em-  
 pirici & Rationales cōtendunt. Particulatim  
 de multis, iuxta eorum singula, vt in quæstio-  
 nibus de latentium causarum inuentione. 19  
 Nempe altera pars corporū incisionem, de-  
 monstrationem & dialecticam speculationē  
 commendant; instrumenta videlicet, quis ab-  
 dita indagantur. Empirici nec inuenire quipa-  
 piam incisiones cadauerum: nec si inueniāt, 21  
 necessarias esse medicinæ: imō nec indica-  
 tionem omnino subsistere, nec aliud ex alio  
 cognosci posse contendunt. Omnia enim sui  
 notitiam requirere: nullius autem rei natu-  
 ra obscuræ vllum esse indicium, insuper nec 20  
 Dialectica quamuis artem desyderare. Post  
 etiam aduersus Dialecticas hypotheses atque  
 diffinitiones quippiam commentantur. Ad  
 hanc rerum natura latentium demonstratio-  
 nem nullam omnino esse pronuntiant. Iam 25  
 vero de vitiosis demonstrandi modis quibus  
 Dogmatici vti consueverunt, de omniq; ratioci-  
 natione nonnulla dicūt: puta hanc quod polli-



cetur inuenire non posse: vel aliam quamlibet  
 artem, nec vitæ humanæ rationem in ea ver-  
 fari & consistere. Porro quæ evidens ratio il-  
 lis dicitur, latentium causarum inuentioni utilis  
 est: sic enim vocant, quæ quidem ex sensuum  
 numero sunt, nondum tamen apparent. Nec  
 minus confert arguendis ijs, qui aduersus ma-  
 nifesta quippiam audent dicere. Pari modo ad  
 indicanda, quæ in apparentibus omittuntur,  
 16 tum ad sophistarum cauillos euitandos con-  
 ducit. Ab evidentibus nunquam recedit, verum  
 in his perpetuo versatur: non tamen hæc ratio-  
 cinatio, quæ Græci ἀναλογισμὸς appellat, sed  
 à manifestis incipit, ad obscura vero semper  
 15 desinit: atque huius rei occasione multiformis  
 est. Nam ab evidentibus ipsis, ad abdi-  
 ta alia, atque alia proficiscitur. Hic modo dis-  
 cordiæ improbabilem concitant: quæ indicio  
 esse dicunt, illa non comprehendi posse. Si-  
 20 quidem comprehensionis vocabulo, veram,  
 stabilemque scientiam designant. Incom-  
 prehensionis (ut ita dicam) inscientiam.  
 Iterum incomprehensionis discordiæ impro-  
 babilis causam esse aiunt: discordiam rursus  
 25 incomprehensionis signum improbabilem de  
 latentibus dissensionem, non de perspicuis  
 ieiuniant. Nam vnumquodque hic apparet  
 vera loquentibus testimonium exhibet: falsos



CLAVD. GAL. PER G.

coarguit. Hoc gen<sup>9</sup> sex millia Empirici & Ra-  
 tionales mutuò sibi obijciunt: curationē, qui  
 in vtraq; secta legitimè exercitati sunt, in eis-  
 dem affectibus eandem molientes. Cæterum  
 Methodici, sic enim se ipsos nominarūt, quā- s  
 doquidem non vt Dogmatici artem via & ra-  
 tione quadam, græci μέθοδος appellant, artem  
 administrandā esse asseuerant, non verbo te-  
 nus cū alijs sectis cōtendere, sed multa quo-  
 que artis opera transformare videntur. Qui 10  
 neque locum affectum ad curationis iudica-  
 tionem prodesse quicq; aiunt, neque causam,  
 neq; ætatem, neque tempus, neq; regionem,  
 neque viriū ægrotantis inspectionē vel natu-  
 ræ, vel ipsius habitus. Negligunt tempora an 15  
 ni, loca, & consuetudines: à solis affectionibus  
 remedij indicatione petita contenti: eamque  
 sufficere dicentes. Nihil autem ab his specia-  
 tim, sed cōmuniter, vniuersimque statuunt.  
 Atque iam communia vocant. Quæ simul 20  
 ipsa particularia omnia perstringunt. Iam ve-  
 ro nonnulli morborum, qui ex victus ratione  
 proueniunt, nonnulli omnium sermone abso-  
 luto duo communia, & tertiū aliquod mixtū  
 indicare nituntur. Nominant astrictū, & flu- 25  
 ens. Hic autem omne morborum genus cō-  
 prehendi, aut ex vtroq; mistum esse aliquid  
 arbitrātur. Cum naturalis corporum euacua-



tio minus probè perficitur, astrictiōe: cum iusto magis, fluore: quū resoluitur corpus & comprimitur, mixtum vitiū nomināt. Quē admodum in oculo inflammatione simul & fluore laborante. Etenim phlegmonē astrictā licet affectū, quoniā nō sola modo, sed cū fluore in vno eodēque loco accidit, vniuersum morbum compositum generare. Auxilij indicationem statim si corpus astrictum est, dīgerendum esse: si profluuiū laborat, continendum. Genu nāq; si inflammationem sentiat soluendum: ventriculū, vel oculum profluentem, comprimendū tenendūq; esse præcipiūt. Si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo quā alteri. Cur igitur nō Dogmaticos se nuncuparunt, cum indicationi præsidia tribuant? Quia, inquiūt, illi in coniectura rerum latētium volunt esse medicinam: nos autem in manifestis versamur. Denique ita sectā suā vniuersā definiunt, communium, quę explorari possunt, id est euidentium cognitionē. Et ne alijs omnibus artibus eadē cōueniat diffinitio, etenim & illas communitatum apparētium notitias esse iudicant, ideo apponunt medicinę finem consequentium. Quidam illorum non consequētium, sed ipsius fini consonantium adiecerunt. Complures vtrisque additis, metho-



dum esse aiunt manifestarum communita-  
 tum, concordantium, & consequentium me-  
 dicinæ finem, notitiam. Nonnulli sicut Thes-  
 salus quoque, coherentium, & necessariarum  
 ad sanitatem. Atque hæc iam est ratio, cur se  
 Dogmaticos appellari nolint. Quippe laten-  
 tibus ac obscuris se non indigere, ut illi profi-  
 tētur: neque experimenta tantum spectanti-  
 bus annumerari volunt: etsi quàm maxime  
 in evidentibus artem tractent. Nam indica-  
 tione ab ipsis separati sunt: nec tamen in ipso  
 circa evidens exercendi modo se cum Empi-  
 ricis convenire dicunt. Illos enim ab obscuris  
 tanquam incertis, & dubijs recedere se vero  
 quasi ab inutilibus. Præterea Empiricos in  
 apparentibus observationem, ipsos indicatio-  
 nē habere. Hoc itaq; discriminē cum utrisque  
 se habere docent: maxime dum anni tempo-  
 ra, ætates, & hoc genus uniuersa tollunt: quæ  
 nullū planè ut ipsi putāt, medicinæ usum ex-  
 hibēt: solū vero priorib; medicis ostentatiōis  
 gratia plurimi sunt æstimata. Et hoc sum-  
 mum Methodicæ sectæ bonum esse prædicāt.  
 Quinetiam ob hoc gloriantur, seque adnota-  
 tione dignos cēsent. Insuper eum qui vitam  
 esse breuem, longam vero artem dicat, there-  
 pant. Econtrario namq; artem esse breuem, vitā  
 longam. Siquidē omnibus quæ artem iuua-



re falso putata sunt, ablati, & ad sola cōmunia nobis respicientibus, neq; longā adhuc medicinā, neq; difficilem, sed facillimam & perspicuā esse, quæ tota sex mēribus promptissime perdisci queat. Hoc pacto morbos, qui victus ratione sanantur vniuersos, in arctū nimis cōgestos esse: similiter, qui ex manu, & medicamentis auxiliū capiūt. Quin in illis quoq; generatim quædā cōmunia adinuenire student:  
10 adhec remediōrū scopos, numero paucos subiungūt. Vnde mihi non in decantatis illis sex mēribus, sed multo etiā citius tota illorū ars percipi posse videtur. Atq; gratia illis habenda est de tam cōpendiosa disciplina, si mō mē-  
15 tiuntur. Mentientes autem negligentia mihi accusandi sunt. Porro quā iuste quispiam iudicare mihi videatur, ipsos vel hallucinari in vtilibus, vel solos superuacua rectē fugere, iam aperiam. Non etenim exigua esse cōsideratio apparet, neq; ad vsq; verba tātū procedere, quēadmodū Empiricis, & Dogmaticis: cū de prima auxiliōrū inuentione cōtendunt, de presenti vsu inuicem cōuenientes. Verū Methodicā sectā vel artis opera multū offendere,  
20 vel iuuare multum necesse est. Cū iam duplex in rebus iudiciū sit, vnum a ratione sola, alterū ab euidenter manifestis profectum: prius maius est, quā medicina cādidatis cō-



ueniat. Quare de hoc dicere nūc opportunū  
 non est. Alterum, quod in sola euidētia con-  
 sistit, omnium hominū communis est. Quid  
 igitur prohibet hac priore vti quæ simul & re-  
 cens initiatis sit manifesta, & ab ipsis Metho-  
 dicis commendata? Nihil enim aliud quàm  
 apparentia semper laudibus extollit: atq; hæc  
 ubique profitetur: obscura vero omnia in nul-  
 lo usu esse referunt. Age nunc primū causas  
 euidētes Græci *παραταρκτικὰς* nomināt, in-  
 spiciamus: pro iudicij regula, id quod sensibus  
 apparet, constituentes. Primūque Methodi-  
 cus in mediū progressus hūc in modum lo-  
 quatur. Quid tandē ò Rationales & Empirici  
 frigus, æstus, ebrietatē, crudelitatem, plenu-  
 dinem, defectum, labores, otia, ciborum qua-  
 litates, & consuetudinum mutationes frustra  
 tam curiosē inquiritis? Vtrum hæc affectioni-  
 bus corporum neglectis medicaturi estis quæ  
 nequaquam adsunt, verum separātur? Quod  
 ab ipsis generatum est in corpore manet. At-  
 que huic (affectus enim est) remedium exhi-  
 bere oportet. Inspiciendum igitur est, qualenā  
 existat. Si etenim cōpressus morbus, soluen-  
 dum corpus est: si fluēs, tenendū: tractādū-  
 que prout causæ postulant. Quem nūc usum  
 adhuc causa præbet, cum fluidum solutione  
 nunquam indigeat, neque astrictum reten-



sione: indubie nullū, sicut res ipsa indicat. Si-  
milis de cōiūctis, siue cōtinētibus causis Me-  
thodici loquūtur. Nā illas quoq; superuacuas  
esse asserūt, morbo videlicet propriā curatio-  
nem indicante, etiā causā, quæ ipsum fecit in-  
cognita. Eodem dicendi modo ad anni tēpo-  
ra, ætates, & loca descendunt. Atq; hic veteres  
medicos rem tam clarā ignorare demirātur.  
Nā phlegmone, cū morbus sit cōpressus, in-  
quiunt nō æstate si contingat, soluentibus au-  
xilijs opus habet: Hyeme alijs quibusdā: sed  
in vtroq; tēpore eisdem. Neq; in pueritia re-  
laxantibus: in senectute tenentibus. Neque in  
Aegypto resoluētibus: Athenis cōtinētibus.  
Rursus, cū phlegmonæ fluens morbus adsit,  
nunq̃ soluētib⁹, verū perpetuo reprimētib⁹,  
& hyeme, & æstate, & vere, & autūno, cuius-  
cūq; etiā ætatis æger siue in Thracia, vel Scy-  
thia, vel Aethiopia cōtingat. Quare hæc nusq̃  
vsu venire, verū nequicq̃ omnia tā curiosè in-  
uestigari. Quid iam corporis partium inspe-  
ctio, & hæc ne ad curationis indicationē su-  
peruacua est, & inutilis? Quisquā ne audeat  
dicere inflammationē, quā Græci φλεγμονή  
appellant in neruosa parte soluendā esse, in ar-  
teriosa, aut venosa, aut carnosa cōprimēdam?  
An omnino tam impudens quispiam sit, qui  
astrictā corporis partē non digerendam esse,

i. j.



CLAVD. GAL. PERG.

profluuiio laborantem non continendam di-  
 stitent. Si igitur partis natura nihil curatio-  
 nis modum immutat, sed auxilia ex affectus  
 genere inueniuntur, quorsum attinet parti-  
 cularum contemplatio? At Methodicus qui- 5  
 dem talis est, vt formula quadam loquendi  
 vtar. Accedit nunc huic secundus Empiricus  
 hunc in modum inquires. Ego quidem eui-  
 dentibus nihil noui præstātius maiusq; esse,  
 nec sapientius quippiam, ijs quæ oculis vsur- 10  
 pui, inueniri posse promitto. Si quidem eui-  
 dentiā vilipendis, quemadmodum prius ali-  
 quem sophistam me audire memini, ad eos  
 qui euidētia sectātur, magnāmq; ipsius ratio-  
 nē habent, hinc facessere tēpestiuū nobis vi- 15  
 detur. Tu sanè Cadmeam victoriā celebrabis.  
 At si, vt ab initio abs te audiuius, cuiuslibet  
 obscuri nullū esse vsum dices, euidētia solū cō-  
 secutus, forsan ostendero in manifesti mētio-  
 ne, quod tu præteristi. Homines duo à rabio- 20  
 so cane morfi, ad Medicos familiares sibi, re-  
 media petitori concesserunt. Sed exiguū adeo  
 vtriusque vulnus erat, vt ne cutim quidem  
 totam penetraret. Alter itaq; medicorum so-  
 lius vulneris curationem moliebatur, de nul- 25  
 la re alia sollicitus: & quidem paucis diebus  
 partem sanam reddidit. Alter vero, cum rabi-  
 re canem deprehendisset, contrarium à prio-



re semper egit, vulnus multo maius faciens:  
 validis diu, acribusque medicamentis vsus, tū  
 pharmaca interim aduersus rabiem confecta,  
 vt ipse dicebat ægrum assumere coegit, tan-  
 5 tum abest, vt cicatricem vulneri statim in-  
 duxerit. Tu nunc quē vtriusque curatio eue-  
 tum habuerit, audi. Qui medicamenta bibit,  
 sanitati pristinae restitutus est. Alter, qui nihil  
 se mali habere putabat, subito aquam exti-  
 10 mescens conuulsione interiit. Nunquid hic  
 præcedens causa in ijs superuacuo tibi inqui-  
 sita esse videtur? An ob aliam ille mortuus  
 est, quā medici negligentiam, qui nihil de  
 morbi causa sciscitatus sit, neque remedium  
 15 ad eam obseruatam administrarit? Hac sola  
 meo quidem iuditio, causa mortis illius exti-  
 tit. Quoniam vero manifesta sector, id genus  
 causarum nullam præterire non possum. Pa-  
 ri modo nec ætatem omittere, aut paruifa-  
 20 cere manifesta. Nam hæc quoque mihi fidem  
 faciunt, eosdem planè affectus, non eandem  
 semper curationem requirere. Sed interim in  
 diuersis ætatibus tantum differre, vt nō quan-  
 titate solum, vel modo auxiliorum, sed toto  
 25 genere euariant. Vidi nanque sepius multis  
 ætate florentibus, & rabidis: etiam me cōsul-  
 tore sanguinem missum, verum nulli vel se-  
 nio planè confecto, vel adhuc puero admodū.

i. ij.



CLAVD. GAL. PERG.

Nec vos ausi estis venam incidere, nec ullus  
 alius vnq̃. Quid autem sibi vult Hippocrates,  
 quū ait: Sub canicula, & ante eā purgationes  
 malæ. rursus. Aestate superiores, per hyemē  
 inferiores partes expurgare cōuenit. Verē, an  
 secus nobis dicere videtur? Ad vtrunq̃ enim  
 quid respōdeatis, non habere vos arbitror. Nā  
 si mentiri eū dixeritis, euidentia minus æsti-  
 mabitis, quæ vobis in pretio esse fingitis. Ve-  
 ritas siquidē vt Hippocrates scribit, apparet. 10  
 Sin autē vera loqui eū censeatis, tēpora quo-  
 que, & loca, quæ superuacua esse cōtendistis,  
 admittetis. At puto vos nunquā à patria ve-  
 stra longe peregrinatos esse, nec locorum di-  
 uersitatem vsu didicisse. Sciretis utiq̃ eos, qui 15  
 Septentrioni subiacent vniuersim factas eua-  
 cuationes sufferre nō posse, sicut nec illos, qui  
 Aegyptum, aut Meridanam plagam incolūt.  
 Qui vero medij hos interiacent, ijs venæ in-  
 cisionem sæpe magno fuisse præsidio. Porro, 20  
 quòd nec corporis partes inspicitis, non pos-  
 sum non demirari, vehemētérque absurdum  
 est: nec veris modo, sed etiam illis, quæ vos  
 met agitis contrarium. Quæso per deos, si  
 phlegmone contingat vel in crure, vel in au- 25  
 re, vel in ore, vel in oculo, eadēne erit cu-  
 rādi ratio? Cur nam igitur crurum phlegmo-  
 nas scalpello vos diuidentes crebro conspexi,



oleoque vngētes: oculos nō item? Hos etenim  
 phlegmone laborātes astringentibus medica-  
 mentis curatis, nō tamen eisdem crura perun-  
 gitis? Cur non itidem aures inflammatione  
 5 vexatas oculorū auxilijs sanatis? Cur nō ocu-  
 los, auriū præsidijs? Sed aliud auriū, aliud ocu-  
 lorum inflātionis medicamē est. Acetum  
 siquidem cū oleo rosaceo auriū phlegmonæ  
 præsens est remediū. Neminem tamen puto  
 10 idem exhibiturū oculis inflāmatis. Quia si quis  
 tam sit temerarius, nō mediocri offensa certo  
 noui temeritatem suā experturū. Et gurgu-  
 lioni phlegmone obsessō pulchrē succurrit  
 spinæ Aegyptiæ fructus, sic quoque alumē fissi-  
 15 le. Num igitur hæc quoque oculis inflātionis  
 obnoxijis, & auribus profuerint? An plane è cō-  
 trario magnū detrimētum attulerint? Atque  
 hæc omnia dico, primā vobis hypothesin cō-  
 cedēs, crurum videlicet, & manū phlegmo-  
 20 nas digerendas esse: nec tamē oculorum, aut  
 gurgulionis, aut auriū. Iam vero si crurū ma-  
 nuūque inflātionem non quouis modo la-  
 xandas esse monuero, forsan in mentē vobis  
 veniet, si sapiatis, quantū à scopo aberraueri-  
 25 tis. Erit autē præsens sermo manifesti cōme-  
 moratio. Qui enī ex nulla re, sed vltro in par-  
 te quacūque inflātionē sortiūtur, ybi pletho-  
 rica adsit affectio, nullā particulę relaxationē,  
 i. iij.



prius desiderant quàm corpus euacuatum sit.  
 Nō enim phlegmonen præsentiē, si id feceris,  
 imminues, sed potius augebis. Quo fit, vt hu-  
 iusmodi tempore astringentia refrigeratiāq;  
 parti admoueamus. Simulatque vero totum s  
 euacuauerimus, tūc particula sustinebit laxā-  
 tia. Sin autē hęc vobis nō persuadeo quod in  
 orationis exordio diximus, ad illos, quib<sup>9</sup> ma-  
 gnifiūt euidentia digredi nos tēpus postulat.  
 Hęc Empirico cōmemorante, Dogmaticus 10  
 accedat, & hūc in modum orationē instituat.  
 Nimirū si quid mentis haberes, hęc abunde  
 satis te erudirent, nec ætatē, nec loca, nec cau-  
 sas præcedentes, nec corporis partes frustra  
 disquiri. Cæterū si nondū Empiricus eviden- 15  
 tiū enarratione hoc tibi persuasit, sed alia ad-  
 huc oratione opusest, eā apponere nūc cogito,  
 quò sectæ tuæ hypothesin infirmā esse de-  
 monstrem. Audio enim sectā vestram apparē-  
 tium cōmunitatum esse cognitionem. Inter- 20  
 rogavi autem crebro, in qua re potissimū ipsa  
 cōmunitas consistat, quóque modo eam co-  
 gnoscamus. Siquidē cognoscere me etiānum  
 posse non videor. Causam verbotenus eandē  
 omnes tractatis, re vero nō consentitis. nōnul 25  
 li enim vestrū excretionibus præter naturam,  
 astrictū & fluens adnumerāt. Cū quidem re-  
 tinētur excremēta, obstructionē: quū immo-



derate excernuntur, profluuiū, affectionē ap-  
pellant. Alij quidam è vestro cœtu inter re-  
liquas corporum constitutiones affectus esse  
pronuntiant, querunturq; de ijs vehementer  
5 qui ad corpus, quod euacuatur, respiciunt. At  
quomodo mihi vtraq; pars errare videat̃, for-  
tassis iam ostēdero. Ad eos autē sermo noster  
prius dirigatur, qui excretiōibus præter natu-  
rā, affect⁹ attribuūt. Nā demiror ipsos, si ne-  
10 que sudores vnq̃, neq; vrinas, neq; vomitus,  
neq; deiectiones plures quàm naturalis habit⁹  
exigit in morbis cōmode vacuatis viderūt: &  
quod lōge absurdissimū est, si neq; ex naribus  
fluore aliquando morbū finiuisse cōspexerūt.  
15 Huius siquidē nō modo qualitas, sed totū ge-  
nus à natura recedit. Sudorū, vrinarū, & eorūq;  
per aluū, & vomitū proruūt genus, nō præter  
naturā est. Sic tamē immodica est interim co-  
pia, vt ego viderim nōnullos tātū sudorē pro-  
20 fudisse, vt etiā culcitrās madefecerūt: alios rur-  
sus supra heminas triginta per sedē deiecisse.  
Sed nihil horū videbat̃ cessare, quia id, quod  
offendebat, euacuabat̃. Etsi hæc symptomata  
naturalibus excretionib⁹ regula vtēti euitāda  
25 erant. Quamobrē probabiliore quodāmodo  
esse videntur, qui in corporum statibus com-  
munitates statuunt. Sed hos quoq; demiror,  
quomodo nō apparētes eas appellare dubita-

i. iij.



CLAVD. GAL. PERG.

uerint. Nam si quid ex aluo profluit, non est  
fluxus, verū corporis affect⁹, ex quo ipsum est  
fluēs, nulli autem sensui hic apparere potest,  
qua ratione adhuc cōmunitates dixeris cui-  
dētes? In colo enim, & tenuioribus intestinis, 5  
& ieiuno, & ventre, & meseræo alijsq; multis  
intestinis, quorū nulla, aut affectiones in ipsis  
sensu deprehendi possunt, profluuiū esse con-  
tingit. Qua igitur fronte cōmunia dixeritis  
apparētia, nisi quod signis innotescere queat, 10  
id apparens seu euidens quispiā vocare volue-  
rit. Si hoc ita est, quonā discrimine à veteribus  
medicis adhuc different, ignoro. Quomodo  
rursus statim & in semestri artem se docere  
promittunt? Etenim nō methodus exigua, ad 15  
alicuius quod sensum effugit, cognitionē desi-  
deratur. Quinetiam anatomes vsus pulchre  
hoc administranti necessarius est, vt quæ par-  
tis cuiusque interioris naturā edoceat. Adhæc  
naturalis speculationis haud parua, qua par- 20  
tium singularium munus, & vsum inspicias.  
Prius q̄ enim hæc inueneris, nullius in alto  
sitæ particulæ affectū licet cognoscere. Quid  
opus est verbis? hic dialecticæ vsus necessarius  
est, vt ex quo quid colligitur cōprehēdas: nec 25  
sophismatibus circunueniaris aut ab alijs, aut  
abs te ipso. Quoniā interdum nobismet vel  
inuitis illudi, videre licet. Atqui profluuium,



quid sibi velit, lubēs ex eis quærerem, si disse-  
rendi facultatem didicissent. Nō enim hoc so-  
lum credo satis esse, quod à quibusdam illorū  
dictū est, profluuiū, videlicet affectionē nomi-  
5 nari, naturæ contrariā. Quippe nisi quid sit  
affectio teneamus, nihil amplius adeo cogno-  
uerimus, An relaxatio, aut mollities, aut rari-  
tas sit. Nihil siquidē vel ipsis dicētibus mani-  
festi audies. Sed quod ipsis in mentē venerit,  
10 nūc hoc, nunc illud, plerunque simul omnia,  
tanq̃ nihil differētia. Qz si quis ipsos, quomo-  
do hæc inter se variēt, quodq; singula propriā  
requirāt inspectionem, docere conetur, eum  
nullo pacto audire sustinēt, sed veteres inces-  
15 sunt caluniātūrq; tanq̃ frustra huiusmodi dif-  
finiētes. Tam otiosi ac segnes in veritatis in-  
quisitione reperiūtur. Imò nec quod laxo ten-  
sum, molli durū, raro densum existat contra-  
riū, dicere nos patiūtur. Insuper ad hæc om-  
20 nia, aliud esse naturæ excretiones contineri,  
aliud fluere, quēadmodū ab Hippocrate etiā  
vniuersa hæc definita sunt: verū temere, nullo  
iudicio, & clausis oculis de his sententiā pro-  
ferunt: & phlegmonē (sic autē vocant durū,  
25 renitentē, dolore plenū, & calidum tumorē)  
prompte admodū, & incōsulto affectum esse  
astrictū pronuntiāt. Deinde porrò phlegmo-  
nas alias nominant implicitas, velut oculorū



CLAVD. GAL. PER G.

inflāmatiōes, vbi cū fluore fuerit, tōsillarū, gur-  
gilionis, palati, & gingiuarū. Postea subiūgūt  
meat⁹ alios raros, alios patētes: ideo vtrosq; iā  
esse affectos. Quosdā vero nō pudet dicere, in  
vno eodēq; meatu & fluorē, & astrictiōē pos-  
se consistere, quod ne quidē cōsiderare facile  
est. Tā sunt in ōni re audacter temerarij, At  
pauci quidā ex ipsis, vbi paulo copiosi⁹ de his  
omnibus tū audire, tum disceptare pro virib⁹  
sustinuerint, vix tādē pœnitētia ducti ad veri-  
tatē se cōuertūt. His igit̃ qui accuratius de pri-  
mis, & generalib⁹ vitijs cupiūt discere, seorsū  
cōmētarios scripsimus. Porro vt præsens recē-  
tioribus medicinæ cādidas, frugē aliquā ad-  
ferat, pauca aduersus eos dicere, æquū fuerit. 10  
Optarē sanē illos fructū aliquē inde referre.  
Referrēt haud dubie, si cōtentiōe relicta, ser-  
monē ipsum apud se paulisper examinarent.  
Sermo ita habet. Phlegmone, vt ipsi vocāt, tu-  
mor est præter naturā, dolorē pariens, durus, 20  
tactui resistēs, & calidus: nullam magis partē  
pro sua ipsius portiōe vel rariorē q̃ fuit antea,  
vel duriorē, vel densiorē reddēs, sed humore  
superfluo repletā, eoque intēsam. Non tamē  
si quid omnino tensum est, id quoq; densius, 25  
aut durius, ac antea euadit, discas hoc in co-  
rijs, loris, & crinibus, si vehemēter distende-  
re coneris. Pari ratione humorū qui inflam-



matam partē occuparunt remediū est euacua-  
tio. Hæc enim repletioni cōtraria est. Nā eua-  
cuatis humoribus, particulæ statim laxiores  
fiūt. Tēsio certe repletas necessario sicut rela-  
5 xatio euacuatas sequitur. Densitas autē, vel ra-  
ritas, neutrū ex necessitate comitatur. Quin  
nec fluor, vel retentio. Neq; enim si rerū iam  
quippiā, id inde fluere prorsus necessitas po-  
stulat. Nā quid, si quod cōtinetur, crassum, &  
10 modicū fuerit? Neq; si densum, teneri? Quia  
copiosū, & tenue etiā per dēfos effluit meat⁹.  
Sati⁹ igit ipso ex veterū libris relectis didi-  
cisse, quot modis id quod pri⁹ in particula cō-  
tinebat, denuo excernitur. Etenim rarescēte,  
15 quod ipsum cōtinet, & eo quod cōtinet, atte-  
nuato, maiorēq; reddito, & vehemētior moto,  
tū ab exteriorū aliquo attracto, vel impulso,  
& velut à quibusdā resorpto. Iā vero si quispiā  
his omnib⁹ neglectis vnā vacuatiōis causam  
20 meatuū raritatem esse putauerit, is ne appa-  
rētia quidē cognoscere videbitur. Nam lanā,  
vel spōgiā, vel huiusmodi rarū quippiā mani-  
festō videmus, si parū intus in se humoris ha-  
beāt, retinere id, nec dimittere: si multū refun-  
25 dere. Cur igit nō de oculis quoq; & narib⁹, &  
ore, alijsq; nō min⁹ raris id ipsū cōsiderarūt, nē  
pe fieri possē, vt in hūoris, q̄ ipsis inest copia,  
nūq; nisi ob meatuū raritatē quippiā effluere.



CLAVD. GAL. PER G.

Enimuero figulares ollas subinde videmus  
adeo raras, vt aqua in eas infusa, perfluat: non  
perinde mel. Crassior etenim mellis substātia  
est, ollæ meatibus. An igitur vero dissimile  
erat, si frequēter tenuitatis causa quid efflue-  
re dixerim, licet corpus ipsum cōtinens à na-  
tura perforatum nō sit? Quoniā vero natura  
sæpius quæ animal gubernat, impetu vehe-  
mentiore vsa omne superuacuum expurgat,  
quasi expellens propulsansque, quæ tandem 10  
difficultas est in artis operibus diligēter ver-  
sato diu, hoc intelligere? Quippe morborū in-  
dicationes hac ferè ratione fiūt. Prætereo nūc  
reliquas euacuationum causas. Similiter, re-  
tentionum, pares numero, his contrarias. Nō 15  
enim hic sermo magnam cōmoditatē osten-  
deret. Quod autē profuturū aliquando putē,  
eò reuertor: nempe oculū interim posse flue-  
re, vel humore copioso, vel tenui reddito, vel  
à natura per hanc partem expulso, nihil ipsis 20  
corporibus supra naturalem habitum magis  
immutatis. Oportet sanè tenuem humorem  
spissare, crassum attenuare. Naturæ impetū,  
si in tempore contingat, excipere, nihil circa  
oculorum corpora ipsa molientem, vt quæ 25  
fluoris causam non præbuerint. Cæterum aliā  
Phlegmonem astrictum esse affectum arbi-  
trari, aliam implicitam, insignis est demen-



tia. Quandoquidem primum orationis suæ  
obliti sunt, fluens non euacuatione æstimand-  
um esse, nec retentionibus, astrictum: verum  
ad ipsas corporū dispositiones respiciendum.  
5 Cum itaque similes omnino inter se existāt,  
& nulli præsens phlegmone à priori differre  
videatur alio nomine, q̄ quòd ex his quippiā  
defluit, ex illa nō: quomodo nō insigniter ab-  
surdum est aliam phlegmonem implicitam,  
10 aliam astrictam nominare? Deinde quo pa-  
cto nec hoc, quod erat promptissimū illis in  
mentē venit ratiocinari, nec in manu videli-  
cet, nec in pede, nec in brachio, nec in hume-  
ro, nec in tibia, nec in femore, nec in alia qua-  
15 libet corporis parte talē aliquādo phlegmonē  
speciē, qua foras aliquid efflueret inuentam  
esse. Solis autem, quæ os, oculos, & nares infe-  
stant, hoc euenire. Vtrum Iuppiter omnibus  
implicitis comunitatibus instituit, vt earum  
20 nulla vnquam in aliā corporis partem se im-  
mittat, quā oculos, nares, & os? Phlegmone  
siquidem omnia potest occupare, quæ eius ge-  
neratiōis causæ recipiēde sunt idonea. Videas  
enim quædam rara, quædam densa natura:  
25 alia fluere, alia astringi. Nā si utrē, vel aliud  
quid ita obstructū humida substātia repleas,  
nihil diffluet. Si vero spongiam, aliudq; id ge-  
nus rarū, quicquid est superflui, effundetur.



CLAVD. GAL. PER G.

Quid negotij ergo est si cognoscas, quanto  
 omnis alia pellis sit astrictior, ea quæ oculos,  
 nares, & os contegit, particularū naturæ cau-  
 sam attribuere, multis verborū ambagibus,  
 & nugis omissis. Quod enim hoc sic habet, s  
 innuunt cum exulceratione in alijs particulis  
 factæ inflammationes. Quia inter illas quæ  
 tenerior est, fluitat, quæadmodum in oculis,  
 naso, & ore. Donec autem cutis inoffensa &  
 astricta prorsus fuerit, eius quod nihil refun- 10  
 dit, hæc causa, non phlegmonæ species est. Itē  
 si melle, aut pice liquida, non autē immode-  
 rate spongiam aut lanā humectes, nihil pro-  
 pter liquida crassitiem effluit. Porro si aqua,  
 vel eius generis alio, eoque minutissime ea- 15  
 dem arbitror ratione ex oculis nō vsquequaq;  
 aliquid profunditur, aut ppter humorū cras-  
 sitiem, aut quod nō redundāt, vt qui secundū  
 naturā maxime sint cōstituti. Quare eadem  
 phlegmone species non alia re discrepans, q̄ 20  
 substantia influētis crassitie, lippitudinē, siue  
 fluxū generare potest: quā sapientissimi Me-  
 thodici astrictā nomināt creduntq; cum im-  
 plicita, huic esse discrimē, verborum suorum  
 obliti, quæ sursum, & deorsum trāsserūt, cor- 25  
 pareas affectuum, præparatiōes esse, nō in hu-  
 moribus consistere autumantes. Quonā igitur  
 pacto cum in corporibus eadem sit dispositio,



nulla re alia differens, solam vero humorum  
 tenuiū, vel crassorū naturā, sequatur interim  
 alicuius fluor, interim retētio, diuersas esse cō  
 munitates existimatis? Haud secus implici-  
 5 tum vestrum à sensu alienū est. Quantū iam  
 particulatim nō solum in ea medicinæ parte,  
 quæ victu curat, sed etiam quæ manu, & quæ  
 medicamentis medetur, delinquatis, iterum  
 forsan discetis, si ijs nōdū fidem adhibeatis. In  
 10 præsentia vero, quoniā hac medicinæ recens  
 initiatis sufficiūt, libro huic finem imponā.

## Errata sic corrigito.

Foliū. Pagina. Linea

3	1	13	lege consistunt.
3	1	14	extrinsecus incidēs sim- plex est.
12	1	14	dele nomen
16	1	5	κευσαλλοσιδής.
49	1	17	capiendis.
50	2	20	eum
51	1	5	causas pro morbos lege
51	1	12	Esto.
51	1	16	aliam
51	2	1	in ijs
52	2	12	cicatrix.
54	2	11	indicationem.
55	1	19	manifestis
56	2	7	extollunt.
60	2	1	quod.







